

Abamexin® Pour On

Endectocida de Uso Externo

agrovvetmarket s.a.

FORMULACIÓN


Cada 100 mL contiene:

Abamectina..... 0.5 g
Agentes de formulación..... c.s.p..... 100 mL

DESCRIPCIÓN

Abamexin® Pour On es una solución antiparasitaria endectocida para bovinos, porcinos, camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos.

Ab



MECANISMO DE ACCIÓN

Su acción se localiza a nivel de las terminaciones nerviosas propiamente dichas o en la zona de contacto entre una fibra nerviosa y una fibra muscular. La abamectina estimula la liberación masiva a este nivel, de un compuesto químico el ácido gamma aminobutírico o GABA, el cual cumple con la función de neurotransmisor. La presencia de grandes cantidades de GABA a nivel sináptico conduce a un bloqueo total de los receptores específicos localizados en las terminaciones nerviosas, abre el canal del cloro hiperpolarizando la neurona, lo que produce la interrupción de los impulsos nerviosos del parásito y en consecuencia su muerte por parálisis flácida.

INDICACIONES

Es un poderoso antiparasitario externo, formulado especialmente para la aplicación pour on (línea media dorsal), con acción contra cepas resistentes a la ivermectina y otros endectocidas para bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos. Corresponde a una lactona macrocíclica, derivado semi-sintético de una avermectina y producida por el *Streptomyces avermitilis*. Esta indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (moscas, sarna coriódica y sarcóptica, y piojos).

ESPECIES DE DESTINO

Formulación desarrollada y probada para su uso en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

PARASITOS SUSCEPTIBLES

Parásitos Externos:

- Estados larvarios de dípteros causantes de miasis: *Dermatobia hominis* (nuche o tupe), *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Cochliomyia hominivorax*.
- Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Haematopinus suis*, *Solenoptes capillatus*, *Bovicola* spp., *Microthoracius protongiceps* y *Microthoracius minor*.
- Ácaros productores de sarna: *Psoroptes bovis* (syn. *P. communis* var. *bovis*), *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *aucheniae*, *ovis* y *suis*, *Chorioptes bovis*, *Demodex* spp. y *Psoroptes aucheniae* ("caracha", "uma usa").
- Garrapatas: ayuda en el control de *Boophilus microplus*, *Amblyomma parvitarsum*.
- Piojos masticadores: Ayuda en el control de *Damalinea bovis* y *Damalinea aucheniae*.
- Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*): Al ser excretada en parte por las heces, inhibe el desarrollo de sus larvas, y de esta manera coadyuva al control de la población.
- Gusano de la nariz: *Oestrus ovis*.
- Miasis: *Cochliomyia hominivorax*, como preventivo de onfalitis en recién nacidos y en heridas (incluyendo las de castración).

Parásitos Internos:

- Nematodos Gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Haemonchus* spp., *Ostertagia ostertagi* (adultos, L3 y L4, incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata* (adultos y L4), *Ostertagia circumcincta*, *Ostertagia trifurcata*, *Trichostrongylus* spp., *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *Cooperia punctata* (adultos y L4), *Cooperia pectinata* (adultos y L4), *Cooperia curticei*, *Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4), *Haemonchus contortus*, *Bunostomum* spp. (adultos L3 - L4), *Oesophagostomum radiatum* (adultos, L3 y L4), *Oesophagostomum columbianum*, *Oesophagostomum venosum*, *Strongyloides papillosus* (adultos), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spathiger* (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos), *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4), *Trichuris* spp., *Mecistocirrus digitatus* (adultos) y *Thelazia* spp.
- Gusanos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y estados inhibidos), y *Dictyocaulus filaria* (gusano del pulmón o "ichu curu") (adultos, L4 y estados inhibidos), *Metastrongylus* spp (adultos).
- Gusanos renales: *Stephanurus dentatus* (adultos, L4).

DOSIFICACION

Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 500 microgramos/kg. de peso, lo que en la práctica equivale a 1 mL/10 kg de peso vivo.

Aplicar tópicamente a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola.

Para resultados óptimos **Abamexin® Pour On** debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa planificado de control de parásitos. En animales de pelo largo, se recomienda aplicar después de la esquila, asegurándose que el producto tenga contacto con la piel. No se debe mojar a los animales hasta un período de 6 horas después del tratamiento.

PERIODO DE RETIRO

No enviar la carne de los animales tratados a consumo humano hasta transcurridos 49 días desde la última aplicación del producto. No administrar en animales productores de leche, ni durante los 49 días anteriores al parto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Cuando la abamectina hace contacto con la tierra se adhiere rápidamente a ella, y con el tiempo se hace inactiva.
- Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse en forma segura (enterrándolos o incinerándolos). No arrojarlos en cursos de agua ya que la abamectina en forma libre afecta los peces y otros organismos acuáticos.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. Sin embargo es importante recalcar que la aplicación a perros puede provocar depresión del SNC, particularmente en la raza Collie y algunas otras.
- El fabricante no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados de un uso diferente al indicado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos. Utilizar guantes durante la aplicación.
- Aplicar el producto al animal en un espacio ventilado.
- No fumar, beber o comer durante la manipulación y/o aplicación.
- Lavarse bien las manos con agua y jabón luego de la aplicación.
- Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etcétera.
- Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse en forma segura
- Puede aparecer ligera irritación de la piel después del tratamiento.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. No someter a temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los niños y animales.

PRESENTACIÓN

Frasco x 100 mL, 120 mL y Frasco Pourmatic® x 250 mL, 500 mL y 1L.

Reg. SENASA Perú: F.00.00.N.0000

Abamexin® es una registrada de:



agrovvetmarket®
Creatividad en Veterinaria

Av. Canadá 3792-3798, San Luís, Lima 30 - Perú
Central Telefónica: (511) 435.2323 Fax: (511) 435.1833