

Cesti-Tabs® 10

Tabletas

Antiparasitario interno

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

Cada tableta contiene:

Praziquantel..... 50 mg

Excipientes.....c.s.p..... 1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Para el tratamiento y control de infestaciones de todo tipo de gusanos planos (tenias), tanto en formas inmaduras como adultas; entre ellos:

- *Dipylidium caninum*
- *Taenia* spp.
- *Equinococcus granulosus* (arma indispensable para campañas de control y erradicación de hidatidosis).

DOSIFICACIÓN Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Se administra por vía oral con una dosis única. No es indispensable ayuno previo al tratamiento.

Para obtener mejores resultados, se debe pesar al perro (gato) antes de tratarlo para calcular la dosis correcta.

La dosis es de una tableta por cada 10 kg de peso del animal (1/2 por cada 5 kg).

Los perros y gatos se reinfectan normalmente con parásitos, por lo que es necesario llevar a cabo un programa de desparasitación para mantener a los animales libres de ellos.

Cachorros y Gatitos

Tratar cada 6 meses; ante riesgo de infestación alto puede hacerse cada 3 meses. En casos de hidatidosis ver información más adelante.

Hembras Preñadas y en Lactación

Tratar previo a la monta, una semana antes del parto y a las 2 y 4 semanas luego del mismo.

Estas recomendaciones son generales. En casos específicos donde la infestación es alta o cuando muchos perros son alojados juntos, el tratamiento dependerá exclusivamente del criterio del profesional.

RECOMENDACIONES Y ESPECIFICACIONES DE DOSIFICACIÓN

Dipylidium caninum: El tratamiento cada 6 (o 3 meses) es adecuado. Tener en cuenta que *Dipylidium caninum* puede reinfestar a los perros y comenzar a producir proglótidos (segmentos planos en forma de barril) de 3 a 4 semanas luego del tratamiento. Si estos proglótidos reaparecieran en las heces antes del siguiente tratamiento; simplemente adelántelo. Este parásito usa como hospedero intermedio a las pulgas, por esto el tratamiento debe acompañarse con un adecuado control de pulgas.

Equinococcus granulosus: (Tenias hidatídicas) La hidatidosis es una enfermedad transmisible a los humanos producida por la larva de la tenia *E. granulosus*. Se deberá cumplir además con todas las medidas exigidas, entre ellas la de no alimentar a los animales con vísceras crudas de ninguna especie (para romper el ciclo de vida de las tenias). Las heces de animales tratados y supuestamente infestados con *E. granulosus*; deben ser eliminadas (incineradas); por lo menos los tres días posteriores al tratamiento. Se recomienda bañar al animal.

NORMALMENTE LOS PERROS SE REINFESTAN CON PARÁSITOS POR LO QUE ES RECOMENDABLE LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON DOSIFICACIONES PERIÓDICAS.

CONSEJOS ÚTILES PARA LA DOSIFICACIÓN

Esconda la tableta en la comida al momento de alimentarlo. De ser necesario, las tabletas pueden romperse o triturarse y ser mezcladas con el alimento. También puede seguirse el siguiente procedimiento.

- Tomar al perro por la cabeza con una mano y con la otra apoyar los dedos pulgar e índice en el ángulo de la boca y por debajo de ella.
- Abrir la mandíbula presionando con los dedos pulgar e índice hacia el centro de la boca, inclinando la cabeza del animal hacia atrás.
- Con el dedo empujar la tableta hacia la base de la lengua.
- Cerrar la boca y masajear la garganta para que sea tragada.

CÓMO PESAR A SU MASCOTA

Primero pésese usted mismo. Luego alce a su mascota y pésense juntos. El peso de su mascota resultará de la diferencia.

SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD

Cesti-Tabs® 10 es completamente seguro y efectivo para perros y gatos. Puede ser administrado hasta 5 - 10 veces la dosis normal, sin ningún efecto adverso. No es indispensable ayuno previo al tratamiento. Es uno de los antiparasitarios más seguros para animales jóvenes y puede usarse en animales debilitados, viejos y en hembras en cualquier estadio de preñez. Es compatible con cualquier otro tratamiento, incluyendo tratamientos contra pulgas, garrapatas, etc.

FARMACOCINÉTICA

El praziquantel, droga activa de Cesti-Tabs® 10, se absorbe rápidamente, es metabolizado en el hígado y excretado por orina y bilis.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15°C y 25° C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

Reg. SENASA Perú: F. 08.04.N.227;
Reg. Guatemala: PE243-42-10-1857;

Cesti-Tabs® es una marca registrada de



agrovetmarket
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Peru

Tel.: (511) 2 300 300

E-mail: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Fabricado por Pharmadix Corp. S.A.C.

Av. Santa Lucía Nro. 218 - Urb. Ind. La Aurora - Ate. Lima - Perú

Cesti-Tabs® 10

Tablets

Internal antiparasitic

agrovetmarket s.a.

FORMULATION

Each tablet contains:

Praziquantel..... 50 mg

Excipients..... q.s.ad

INDICATIONS

For the treatment and control of infestations due to any type of adult or immature tapeworms in dogs and cats, such as:

- *Dipylidium caninum*
- *Taenia spp.*
- *Echinococcus granulosus* (indispensable weapon for control and eradication of hydatidosis)

DOSAGE AND ADMINISTRATION ROUTE

Administered by oral route with a single dose. Previous fast is not indispensable for the treatment.

For best results, the dog or cat should be weighted before treatment to calculate the correct dosage.

The dosage is 1 tablet for every 10 kg. b.w. (1/2 tablet for each 5 kg.)

Dogs and cats are normally reinfested with parasites for which is necessary to carry out an antiparasitic schedule to keep animals free of them.

Puppies and kittens

Treat every 6 months; in the presence of high infestation it could be done every 3 months. In case of hydatidosis see information below.

Pregnant and bitches in lactation

Treat previously to mount, a week before birth and 2 and 4 weeks after it.

These recommendations are general. In specific cases where the infestation is high or when too much dogs are put up together, treatment will depend exclusively on professional criteria.

SPECIFIC DOSAGE RECOMMENDATION

- *Dipylidium caninum*: the treatment every 6 (or 3) months is adequate. *Dipylidium caninum* can reinfect dogs and start to produce proglottids (barrel shape flat segments) 3 to 4 weeks after the treatment (this parasite uses the fleas as intermediate host). If these proglottids reappear in the feces before the next treatment; simply bring it forward. Because of this, the treatment should be done together with an adequate flea control.
- *Echinococcus granulosus*: (Hydatidic taenia) hydatidosis is a transmissible illness to humans produced by the *E. granulosus* larvae. Moreover, dogs should not be fed with raw viscera of any specie (to brake the taenia life cycle). The feaces of the animal treated and supposedly infested with *E. granulosus*; should be eliminated (incinerated); at least for the three subsequent days of the treatment. It is recommended to bathe the animal.

Dogs and cats are normally reinfested with parasites for which is necessary to carry out an antiparasitic schedule with periodical dosage.

DOSAGE USEFUL ADVICES

Hide the tablet in the food. If necessary, the tablets can be broken or grinded up and mixed with the food. The follow procedure can also be performed:

- With one hand, take the dog by its head and with the other lean the thumb and index in the mouth angle and below it.
- Open the jaw pressing with the thumb and index toward the center of the mouth, leaning the animal's head backwards.
- Push the tablet with the finger towards the tongue base.
- Close the mouth and massage the throat.

HOW TO WEIGHT THE DOG

First weight yourself. Next, carry your pet and weight together. The pet's weight will result from the difference.

SECURITY AND COMPATIBILITY

Cesti-Tabs® 10 is completely safe and effective for dogs and cats. It can be administer 5 - 10 times the normal dosage without any adverse effect. Previous fast is not indispensable for the treatment. Is one of the safest antiparasitics for young animals and can be used in weak, old animals and in bitches in any pregnant stage. It is compatible with any other treatment, including treatment against fleas, ticks, etc.

PHARMACOKINETIC

Praziquantel, active ingredient of **Cesti-Tabs® 10** is absorbed quickly, metabolized in the liver and excreted by urine and bile.

STORAGE

Keep in a dry, cool place, protected from light. Storage among 15°C to 30°C. Keep out of reach of children and domestic animals.

Reg. SENASA Perú: F.08.04.N.227;
Reg. Guatemala: PE 243-42-10-1857

Cesti-Tabs® is a registered trademark of:



agrovetmarket

animal health

Av. Canadá 3792-3798, San Luís. Lima 30 - Perú

Telephone: (511) 2300 300

Email: ventas@agrovetmarket.com

www.agrovetmarket.com