



Polvo Soluble

Colistix[®] WS

Colistina (como sulfato) al 10%*

Tratamiento de elección
para **enteritis bacterianas.**



Acción directa contra enterobacterias patógenas



Mínima absorción a nivel intestinal



Sin periodo de retiro en huevos

Avivet[®]

Ingredientes de Avanzada



(*) Cada gramo de **Colistix[®] WS** contiene 3.000.000 UI de colistina base.

Colistix® WS

Colistina (como sulfato) al 10%*

Colistix® WS antibiótico polipéptido oral en base a colistina sulfato, posee una alta actividad bactericida principalmente contra bacterias Gram -.

- *E. coli*
- *Enterobacter* spp.
- *Klebsiella* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus* spp.
- *Brucella* spp.
- *Campylobacter* spp.
- *Shigella* spp.

Antibiótico de elección para la prevención y tratamiento de infecciones entéricas reduciendo la proliferación bacteriana, manteniendo la integridad intestinal al equilibrar la microbiota.

Su absorción en el lumen gastrointestinal es reducida, lo que favorece su acción contra enterobacterias, afectando la permeabilidad de la membrana celular alterando así el metabolismo bacteriano.

Indicaciones

Pollos, Gallos y Pavos

- Tifosis aviar (*Salmonella gallinarum*)
- Púlorosis (*Salmonella pullorum*)
- Infecciones gastrointestinales de etiología bacteriana e infecciones entéricas secundarias a procesos virales.

Cerdos

- Enterotoxemia causada por *E. coli* (enfermedad del edema)
- Colibacilosis entérica
- Salmonelosis
- Diarrea neonatal, de los lechones y post-destete
- Diarreas bacterianas secundarias

24 Alta estabilidad comprobada

Estudios nuestros certifican y garantizan la excelente solubilidad de **Colistix® WS** durante 24 horas en agua muy dura, manteniendo la estabilidad del producto y permitiendo una dosificación homogénea para los animales.

Dosis y Administración

Colistix® WS debe ser administrado vía oral en agua de bebida o mezclado en el alimento.

Aves (pollos, ponedoras, gallos y pavos)				
Dosis	Uso	Actividad Antibiótica (colistina) Litro de agua	Actividad antibiótica (colistina) por 750 kg de alimento	Duración del tratamiento
75.000-100.000 UI/Kg peso vivo / día (125.000 en casos muy graves)	Promotor	100 - 200 g	100 - 200 g	De forma continua
	Preventivo	100 - 200 g	100 - 200 g	Durante el periodo de riesgo
	Terapéutico	300 - 400 g	300 - 400 g	Por lo menos 5 - 7 días continuos

Cerdos				
Dosis	Uso	Actividad Antibiótica (colistina) Litro de agua	Actividad antibiótica (colistina) por 500 kg de alimento	Duración del tratamiento
100.000 UI/Kg peso vivo / día	Promotor	200 - 300 g	200 - 300 g	De forma continua
	Preventivo	200 - 300 g	200 - 300 g	Durante el periodo de riesgo
	Terapéutico	300 - 500 g	300 - 500 g	Por lo menos 5 - 7 días continuos

Pre-rumiantes				
2 veces al día, 1g / 50Kg de peso vivo durante 5 - 7 días en agua, leche o alimento				

- Cualquier factor que afecte el consumo de alimento, podrá influenciar en las dosis recomendadas, siendo necesario modificar los niveles de inclusión.
- Consulte a su Médico Veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

Periodo de Retiro

- Carne: 1 día.
- Huevos: 0 días.

Presentaciones: 50g, 100g y 1kg

(*) Cada gramo de **Colistix® WS** contiene 3.000.000 UI de colistina base.