

Combiótico LA

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Combiótico LA
- 1.2. Clase de uso: antibiótico
- 1.3. Formulación: Suspension Inyectable.

2. COMPOSICION

Componentes	Cantidad
Penicilina G Benzatínica	10 000 000 UI
Penicilina G Procaínica	10 000 000 UI
Dihidroestreptomicina Sulfato eq. a base	20 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: suspensión blanca

4. DESCRIPCIÓN

Antibiótico de mediano espectro y larga acción

5. INDICACIONES

Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes susceptibles a la acción de la penicilina y dihidroestreptomicina incluyendo:

Corynebacterium pyogenes, *Erysipelothryx rhusiopathiae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria spp.*, *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*

También es efectivo contra el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes susceptibles: infecciones del tracto respiratorio incluyendo neumonía y rinitis atrófica, listeriosis, meningitis, septicemia, mastitis, infecciones del tracto urogenital, enteritis asociada con *Salmonella spp.* y en el control de bacterias secundarias que dan origen a enfermedades de origen viral.

La combinación de penicilina y dihidroestreptomicina es especialmente útil en el tratamiento de infecciones que incluyen bacterias grampositivas y gramnegativas

6. ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos.

7. ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

8. DOSIS

- Bovinos, Ovinos, Caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos y equinos: 1 mL/25 Kg
- Caninos, Felinos: 1 mL por 10 Kg

9. PRECAUCIONES

- Agitar bien antes de usar
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Suspender su uso si se observan reacciones adversas.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

- No inyectar por vía intravenosa
- No usar en animales con historia de hipersensibilidad a las drogas de la fórmula.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 30 días

Leche: 72 horas (No administrar a ovinos y caprinos cuya leche se destine a consumo humano).

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C.

13. PRESENTACIÓN

Frasco por 20, 50, 100, 250 and 500 mL

Combiotico LA

Page 1 of 2

1. GENERAL

- 1.1. Commercial Name: Combiotico LA
- 1.2. Class of use: Antibiotic
- 1.3. Formulation: Injectable Suspension

2. COMPOSITION

Each 100 mL of Combiotico LA contains:

Component	Quantity	Unit
Penicillin G Benzathine	10 000 000	IU
Penicillin G Procaine	10 000 000	IU
Dihydrostreptomycin sulphate eq. base	20	g
Excipients q.s.ad	100	mL

3. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES

- 3.1. Aspect: White suspension
- 3.2. Color: white.

4. DESCRIPTION

Broad spectrum, long acting antibiotic

5. INDICATIONS

For the treatment of infectious diseases caused by germs susceptible to the action of penicillin and dihydrostreptomycin including:

Corynebacterium pyogenes, *Erysipelothryx rhusiopathiae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria* spp., *Streptococcus* spp., *Salmonella* spp.

It is also effective against the treatment of infectious diseases caused by susceptible germs: infections of the respiratory tract including pneumonia and atrophic rhinitis, listeriosis, meningitis, septicemia, mastitis, infections of the urogenital tract, enteritis associated with *Salmonella* spp. And in the control of secondary bacteria that give rise to diseases of viral origin.

The combination of penicillin and dihydrostreptomycin is especially useful in the treatment of infections including gram-positive and gram-negative bacteria.

6. TARGET SPECIES

Cattle, horses, sheep, goats and pigs, south american camelids, canine and feline.

7. ADMINISTRATION

To be administered by intramuscular route.

8. DOSES

- Bovine, ovine, caprine, porcine, South American camelids and equine: 1 mL per 25 kg
- Canine, Feline: 1 mL per 10 kg

Combiotico LA

Page 2 of 2

9. PRECAUTIONS

- Shake well before use
- Agrovet Market S.A. is not responsible for the consequences of a different use (of the product) to the one indicated in this leaflet.

10. CONTRAINDICATIONS

- Do not use another route than the indicated one.
- Do not administer to animals with hypersensitivity history to the drug of the formula.

11. WITHDRAWAL PERIOD

- Meat: 30 days.
- Milk: 72 hours (Do not administer to sheep and goats which milk is intended for human consumption).

12. STORAGE

Store at room temperature between 15° to 30 °C, in a dry, well-ventilated place away from the reach of children.

13. PRESENTATION

20, 50, 100, 250 and 500 mL vials.