

Tylvax® OS

Solución Oral - Uso Veterinario

Antibiótico Macrólido de Última Generación

Avivet.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de Tylvax® OS contienen:

Tilvalosina (como tartrato).....10 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

DESCRIPCIÓN

Tylvax® OS es un antibiótico oral macrólido en forma de solución oral para la medicación del agua de bebida de aves y cerdos. Contiene acetilisovaleritiliosina o tilvalosina (bajo su forma tartrato). Provee 100 mg/mL de actividad. Es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes.

Tylvax® OS actúa contra microorganismos Gram positivos y algunos Gram negativos y ofrece una excepcional actividad antimicrobiana. Su mayor metabolito: 3-AT brinda una actividad antimicrobiana adicional. Su eficacia es hasta diez veces mayor que la tilosina; su absorción, biodisponibilidad y concentración en sangre también son mayores comparativamente. Su distribución es amplia y específica en las áreas pulmonares, epitelio respiratorio, células fagocitarias y las células epiteliales intestinales.

ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos, gallos, pavos y pollas de remplazo) y cerdos.

INDICACIONES

Tratamiento de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina principalmente:

- Pollos, gallos y pavos: Enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas, ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).
- Cerdos: Micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M. hyopneumoniae*, Enteropatía proliferativa Porcina (EPP), ileitis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina, causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, Colitis Porcina, causada por *Brachyspira pilosicoli*.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Vía oral, diluido en el agua de bebida a las siguientes concentraciones:

Aves (pollos, pavos y pollas de reemplazo):

- Terapéutico: 1000-1250mL/1000L de agua por 3 días.

Cerdos:

- Terapéutico: Ileitis (EPP): 500 mL/1000 L agua por 5 días. Demás patologías: 500 - 1000 mL/1000 L agua por 3-5 días.

Notas a la Administración:

1. Agregue lentamente el contenido necesario en no menos de 20 L de agua potable limpia y fría, revolviendo continuamente hasta completa disolución. Luego, agregar agua hasta completar el volumen final requerido.
2. Cualquier factor que afecte el consumo de agua puede hacer necesario aumentar los niveles de inclusión.
3. Se ha demostrado sinergia entre tilvalosina y tetraciclinas y se ha demostrado la eficacia de la combinación de clortetraciclina y tilvalosina a dosis menores.
4. Las dosis y duración de tratamiento son referenciales. Consulte con su médico veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Debe ser evitado por animales con historial de hipersensibilidad.
- Cuando se mezcle el medicamento veterinario y manipule el agua medicada, se debe evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas. Lavar manos y la piel expuesta después del uso. En caso de contacto con los ojos, inmediatamente enjuagar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Las personas con conocida hipersensibilidad a la tilvalosina deben evitar cualquier contacto con el producto.
- En gestación y lactancia en cerdas: de acuerdo a evaluación efectuada por el veterinario.
- No utilizar en cuyes, chinchillas ni hamsters.
- Agrovét Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

PERIODO DE RETIRO

Cerdos: 1 día. Aves: 2 días. Gallinas de postura: 0 días.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. No conservar por encima de 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto y no almacenar frascos abiertos. El agua con el producto debería de ser consumida dentro de las 24 horas de su preparación.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos x 20, 30, 50, 100, 250, 500 y 1000 mL. Envases x 5, 10, 20 y 25 L.

Reg. SENASA Perú: F.082.032.N.01002; Reg. Ecuador: RIP-02-FAR-01348; Reg. Guatemala: MV-3213; Reg. Nicaragua: MV-16702.

Tylvax® es una marca registrada de Agrovét Market S.A.

Avivet® es una división de Agrovét Market Animal Health.

Importado y distribuido en Ecuador por AgrovétMarket del Ecuador S.A.S. Italia N32-10 y Mariana de Jesús, Quito.

Fabricado en Perú por Pharmadix Corp. S.A.C. para y bajo licencia de Agrovét Market S.A.

VENTA BAJO RECETA

Avivet.

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 15021 - Perú
(511) 2 300 300
ventas@agrovétmarket.com
agrovétmarket.com

Agrovét
MARKET

Tylvax® OS

Oral Solution - Veterinary Use

Last Generation Macrolide Antibiotic

Avivet.

COMPOSITION

Each 100 mL of Tylvax® OS contains:

Tylvalosin (as tartrate).....10 g
Excipients q.s.ad.....100 mL

DESCRIPTION

Tylvax® OS is an oral macrolide antibiotic in the form of an oral solution for medicating drinking water for poultry and pigs. It contains acetylisovaleryltylosin or tylvalosin (in its tartrate form). It provides 100 mg/mL of activity. It is highly effective against several major diseases.

Tylvax® OS acts against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms and offers exceptional antifungal activity. Its major metabolite, 3-AT, provides additional antimicrobial activity. Its efficacy is up to ten times greater than that of tylosin; its absorption, bioavailability, and blood concentration are also comparatively higher. Its distribution is broad and specific to the lung areas, respiratory epithelium, phagocytic cells, and intestinal epithelial cells.

TARGET SPECIES

Poultry (chickens, roosters, turkeys and replacement pullets) and pigs.

INDICATIONS

Treatment of respiratory and enteric diseases caused by microorganisms sensitive to tylvalosin mainly:

- Chickens, roosters, and turkeys: Chronic respiratory disease (CRD), air sacculitis, and infectious sinusitis caused by *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, and *Mycoplasma meleagridis* (turkeys). *Clostridium perfringens* -associated necrotic enteritis, bacterial enteritis, ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).
- Pigs: Mycoplasmosis, mycoplasmal pneumonia (enzootic) caused by *M. hyopneumoniae*, Porcine proliferative enteropathy (PPE), porcine ileitis caused by *Lawsonia intracellularis*, Porcine dysentery, caused by *Brachyspira hyodysenteriae*, Porcine colitis, caused by *Brachyspira pilosicoli*.

ROUTES OF ADMINISTRATION AND DOSAGE

Oral route, diluted in drinking water at the following concentrations:

Poultry (chickens, turkeys and replacement pullets):

- Therapeutic: 1000-1250mL/1000L of water for 3 days

Pigs:

- Therapeutic: Ileitis (EPP): 500 mL/1000 L of water for 5 days. Other pathologies: 500-1000 mL/1000 L of water for 3-5 days.

Notes to Administration:

1. Slowly add the required amount to at least 20 L of clean, cold drinking water, stirring continuously until completely dissolved. Then, add water to reach the final required volume.
2. Any factor affecting water consumption may require increasing the inclusion levels.
3. Synergy between tylvalosin and tetracyclines has been demonstrated, and the combination of chlortetracycline and tylvalosin has been shown to be effective at lower doses.
4. Doses and treatment duration are for reference only. Ask your veterinarian before starting any treatment.

PRECAUTIONS AND CONTRAINDICATIONS

- Should be avoided by animals with a history of hypersensitivity.
- When mixing the veterinary medicinal product and handling the medicated water, direct contact with the eyes, skin, and mucous membranes should be avoided. Wash hands and exposed skin after use. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. In case of accidental ingestion, seek medical advice immediately and show the label.
- People with known hypersensitivity to tylvalosin should avoid contact with the product.
- During pregnancy and lactation in sows: according to the assessment performed by the veterinarian.
- Do not use on guinea pigs, chinchillas, or hamsters.
- Agrovét Market SA is not responsible for the consequences arising from the use (of the product) other than that indicated.

WITHDRAWAL PERIOD

Pigs: 1 day. Poultry: 2 days. Laying hens: 0 days

STORAGE CONDITIONS

Store in a cool, dry place, protected from light. Do not store above 30°C. Keep out of reach of children and pets. It is recommended to use all contents once opened and not store opened bottles. Water containing the product should be consumed within 24 hours of preparation.

COMMERCIAL PRESENTATION

Bottles 20, 30, 50, 100, 250, 500, and 1000 mL, containers in 5, 10, 20, and 25 L.

Reg. SENASA Peru: F.082.032.N.01002; Reg. Ecuador: RIP-02-FAR-01348; Reg. Guatemala: MV-3213; Reg. Nicaragua: MV-16702.

Tylvax® is a registered trademark of Agrovét Market S.A.

Avivet® is a division of Agrovét Market Animal Health.

Manufactured in Peru by Pharmadix Corp. S.A.C.
for and under license from Agrovét Market S.A.

SALE UNDER PRESCRIPTION

Avivet.

42677F5B0002
V1.1025

Av. Canada 3792-3798, San Luis. Lima 15021 - Peru
(511) 2 300 300
ventas@agrovétmarket.com
agrovétmarket.com

Agrovét
MARKET