Vademécum

Animales de compañía

petmedica®

Nutrovet®

Innovación a nivel global

Albania • Antillas Holandesas • Arabia Saudita • Argelia • Azerbaiyán • Baréin • Bangladesh • Barbados • Bielorrusia
Bolivia • Camboya • Chipre • Colombia • Corea del Sur • Costa Rica • Ecuador • Egipto • Emiratos Árabes Unidos
El Salvador • Etiopía • Filipinas • Guatemala • Honduras • India • Indonesia • Jordania • Kenia • Kuwait
Kirguistán • Líbano • Libia • Mauricio • México • Nicaragua • Omán • Pakistán • Panamá • Paraguay • Perú
Qatar • República Dominicana • Rusia • Siria • Sri Lanka • Ucrania • Uruguay • Vietnam

www.nutrovet.com www.agrovetmarket.com www.petmedica.vet

agrovetmarket
animalhealth

Productos Veterinarios de **Clase Única**
Unique Veterinary Products

índice

petmedica®

Antibióticos

Amoxi-Tabs C® -250
Cefoxi-Tabs® C 07

Cipro-Tabs® 250
Liquacef® C 08

Liquamox® C
Otiderma-Cef® 09

Vetamycon® 4 10

Suplementos

Aminoplex® Forte
Aminoplex® Light 12

Ascorvet 250
Hepato-Ject® 13

Antiparasitarios

Cesti-Tabs® 10
Fipronex® Spray 15

Fipronex® Drop On
Fipronex® Duo 16

Fipronex® Duo Drop On 17

Fipronex® G5 Spray 18

Fipronex® G5 Drop On 19

NextGuard® 4 / ProGuard® 4
Oxantel® 5 20

Oxantel® Gel
Profelis® Drop On 21

Proventis® 10 / 20 / 30 22

Xelamec® Spot On 23

Antiinflamatorios

Carprodyl® 25
Carprodyl® 100 25

Vetocam® 50 26

Anestésicos

Dormi-Xyl® 2
Ket-A-100® 28

Ket-A-Xyl®
Penta-Hypnol® 29

Suprivan®
Vetocaína A2 30

Otros

Adrena-Vida®
Diuride® 500 32

Hemostop® K
Hemo-Stop® Tabs 33

VentoCardyl®
Vetactin® 34

Nutrovet®

Nutricionales

Artrosamine®
Cani-Tabs® Daily Multi Puppy 36

Cani-Tabs® Daily Multi Adult
Cani-Tabs® Daily Multi Senior 37

Cani-Tabs® Healthy Bones Ca + P
Cani-Tabs® Hip + Joint Mini 38

Cani-Tabs® Hip + Joint M&L
Cani-Tabs® Immunity & Allergies 39

Cani-Tabs® Omega3 EPA & DHA
Cani-Tabs® Skin + Coat 40

Cani-Tabs® UT Support
FH - 10 41

Nutromix® 42

Petonic® Recuperation 43

petmedica®

Hoy más que nunca, las mascotas ocupan un lugar privilegiado en la familia, desarrollándose entre éstas y sus dueños un vínculo emocional que dura toda una vida.

Por ello, tu papel como veterinario conlleva la gran responsabilidad de velar no solo por la salud de las mascotas, sino también por la tranquilidad de sus amos.

Para ayudarte en esta gran labor, te presentamos **Petmedica®**, una innovadora línea de fármacos orientada a promover la salud y bienestar de los animales de compañía, ofreciendo herramientas específicas para la prevención, manejo de la salud y calidad de vida de las mascotas.

Porque entendemos la profunda conexión entre las mascotas y sus dueños, y porque queremos ser parte de esta genuina relación de confianza con tus clientes, **Petmedica®** será un valioso aliado para ayudar a tus pacientes a vivir mejor y por más tiempo.

Antibióticos

Amoxi-Tabs C® -250

Antibiótico de amplio espectro
con inhibidor de resistencia bacteriana

Tableta oral

Fórmula

Amoxicilina base 200 mg, ácido clavulánico 50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones periodontales causadas por cepas susceptibles (bacterias aerobias y anaerobias). Apropiado en infecciones de la piel y tejido blando causadas por especies susceptibles de *Staphylococcus* spp., *E. coli*, *Pasteurella* spp. y *Streptococcus* spp. Adecuado en infecciones del tracto respiratorio y urinario, incluyendo aquellas causadas por especies susceptibles de *E. coli.* Tratamiento de osteomielitis y otras complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Caninos y felinos: 1 tableta por cada 16 kg de peso vivo cada 8 a 12 horas, lo que equivale a 11 - 20 mg de amoxicilina y 2.75 - 5 mg de ácido clavulánico. Tratamiento de infecciones del tracto urinario, 14 días o más. El tratamiento de pioderma profunda puede extenderse hasta por 21 días. En ningún caso el tratamiento debe exceder los 30 días. La eficacia terapéutica de la amoxicilina y el ácido clavulánico no es afectada de forma significativa por la administración con alimento.

Presentación comercial

Caja por 10 y 50 tabletas.

Cefoxi-Tabs® C

Antibiótico cefalosporínico de última
generación con inhibidor de resistencia
bacteriana y larga vida media

Tableta oral

Fórmula

Cefpodoxima proxetil (equivalente a cefpodoxima 100 mg) 135 mg, clavulanato de potasio diluido (equivalente a ácido clavulánico 62.5 mg) 152.86 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento y prevención de infecciones cutáneas (heridas, abscesos y piodermas) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis, otitis media y otras infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras causadas por gérmenes sensibles a la asociación, principalmente cepas de *Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus* resistentes a las penicilinas, *Streptococcus canis*, (grupo G, ß hemolítico), *Escherichia coli, Pasteurella multocida y Proteus mirabilis,* entre otras.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Caninos: 1 tab por cada 10-20 kg (5-10mg de cefpodoxima/kg) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días luego de la remisión de signos clínicos. Felinos: ½ tab/ 10kg cada 12 horas ó ½ tab/ 5kg cada 24 horas hasta 3 días después de la resolución del cuadro. Los tratamientos y su duración son sugeridos, por lo que queda a cargo del Médico Veterinario tratante, pero el mismo nunca deberá ser menor a 3 días.

Presentación comercial

Caja por 30 tabletas.

Cipro-Tabs® 250

Antibacteriano quinolónico

Tableta oral

Fórmula

Ciprofloxacina (como clorhidrato) 250 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas producidas por bacterias sensibles a la ciprofloxacina: infecciones complicadas o crónicas del tracto urinario como la prostatitis, incluyendo las causadas por organismos susceptibles, entre ellos, *Escherichia* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *Proteus* spp., *Citrobacter* spp., *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp.; infecciones de vías respiratorias inferiores, incluyendo las causadas por *B. bronchiseptica*; infecciones intestinales, diarreas de tipo infeccioso debidas a bacterias patógenas gram negativas como *Escherichia coli enterotoxigena, Campylobacter* spp. y *Salmonella* spp.; infecciones de la piel y heridas causadas por organismos susceptibles incluyendo *P. aeruginosa* y *S. aureus*; artritis bacteriana y meningitis, entre otras.

Dosis y vía de administración

Vía oral.1 tableta/25 kg de p.v. cada 12 horas y 1 tableta/16 kg de p.v. para problemas más complicados.

Presentación comercial

Frasco por 30 tabletas.

Liquacef® C

Antibiótico cefalosporínico de última generación con inhibidor de resistencia bacteriana y larga vida media

Polvo para reconstituir

Fórmula

Cefpodoxima (como cefpodoxime proxetil) 10 mg, ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 6.25 mg , excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones cutáneas (heridas y abscesos) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis y otras infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras causadas por gérmenes sensibles al cefpodoxime.

Dosis y vía de administración

Vía Oral. Preparación: Añada agua hasta la marca del frasco y agite. Deje reposar durante 5 minutos para asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL por cada 1-2 kg (5-10 mg de cefpodoxima/kg) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días luego de la remisión de signos clínicos. Gatos: 1mL por cada 2 kg (5 mg de cefpodoxima/kg) cada 12 horas ó 1 mL por kg (10 mg de cefpodoxima/kg) cada 24 horas o hasta 3 días luego de la resolución del cuadro. La suspensión reconstituída debe almacenarse en refrigeración y puede utilizarse hasta por 7 días.

Presentación comercial

Frasco con polvo para 100 mL.

Liquamox® C

Antibiótico betalactámico de amplio espectro con inhibidor de resistencia bacteriana

Polvo oral para reconstituir

Fórmula

Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) 40mg, ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 5.7 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones causadas por cepas susceptibles (bacterias aerobias y anaerobias): infecciones periodontales, de la piel y tejido blando causadas por especies susceptibles de *Staphylococcus* spp., *E. coli*, *Pasteurella* spp. y *Streptococcus* spp. Adecuado en infecciones del tracto respiratorio y urinario, incluyendo aquellas causadas por especies susceptibles de *E. coli*. Tratamiento de osteomielitis y otras complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Preparación: Añada agua hasta la marca del frasco y agite bien. Deje reposar durante 5 minutos para asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL/2-3.5 kg cada 8-12 horas por 7-28 días. Felinos: 1 mL/2-3.5 kg cada 8-12 horas por 5-14 días. La suspensión reconstituída debe almacenarse en refrigeración y puede utilizarse hasta por 7 días.

Presentación comercial

Frasco con polvo para 100 mL.

Otiderma-Cef®

Combinación antibiótica - antiinflamatoria

Suspensión ótica - dérmica

Fórmula

Cefalexina monohidrato 20 mg, gentamicina 10 mg, dexametasona fosfato sódico 0.075 mg, vitamina A palmitato 1000 UI, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica, dermatitis, piodermas, laceraciones, abrasiones, heridas o cuando se necesite reducción de la inflamación y el dolor. La adición de dexametasona otorga un rápido efecto antiinflamatorio, reduciendo además los signos de dolor y malestar en el animal. La vitamina A actúa como regenerador epitelial en animales con infecciones o inflamaciones debidas a microorganismos patógenos. Asimismo, reduce las consecuencias de procesos infecciosos y participa manteniendo la integridad de los tejidos.

Dosis y vía de administración

Problemas óticos: Limpiar y secar bien el canal auditivo, aplicar el producto y proporcionar un suave masaje en la base de al oreja. Problemas dérmicos: Piel o membranas mucosas. Limpiar el área afectada, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión y distribuir uniformemente o frotar con cuidado. El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al día, la duración varía entre 2 a 6 semanas, dependiendo del criterio del profesional.

Presentación comercial

Jeringa por 15 mL.

Vetamycon® 4

Asociación polivalente antibiótica, antiinflamatoria, antimicótica y antiprurítica

Crema ótica - dérmica

Fórmula

Beclometasona dipropionato 0.025%, gentamicina 0.3%, clotrimazole 1%, lignocaína 2%.

Indicaciones

Para el tratamiento de afecciones e infecciones bacterianas y fúngicas de la piel y oídos.
Indicado en caso de otitis externa, agudas o crónicas. Onicomicosis y afecciones dérmicas de etiología micótica. Afecciones dérmicas de etiología bacteriana, dermatitis exudativas, eczematosas, seborreica o de contacto, intertrigo u otras piodermas. Tratamiento coadyuvante en casos de dermatitis alérgicas por pulgas, dermatosis y alopecia. En laceraciones, abrasiones o heridas. Infecciones de la glándula paranal en caninos.

Dosis y vía de administración

Vía tópica. En afecciones moderadas: De 1 a 7 veces por semana. En condiciones severas, puede ser aplicado 2 - 3 veces diarias (cada 8 - 12 horas). La duración mínima del tratamiento debe ser de acuerdo a la etiología y a la respuesta del curso de la enfermedad, puede variar entre 2 a 6 semanas. La frecuencia de administración depende de la severidad de la lesión y del criterio del Médico Veterinario.

Presentación comercial

Tubo por 15g y 30g.

Suplementos |

Aminoplex® Forte

Aminoácidos en alta concentración

Solución inyectable

Fórmula

Dextrosa 50 mg, cloruro de calcio 0.15 mg, cloruro de potasio 0.2 mg, sulfato de magnesio 0.2 mg, acetato de sodio trihidratado 2.5 mg, hidrocloruro de L-Histidina 0.34 mg, DL-Metionina 0.34 mg, DL-Triptófano 0.34 mg, Hidrocloruro de L-Cisteína 0.34 mg, L-Treonina 0.68 mg, DL-Isoleucina 0.68 mg, hidrocloruro de L-Arginina 0.85 mg, DL-Fenilalanina 1.02 mg, DL-Valina 1.7 mg, hidrocloruro de L-Lisina 1.02 mg, L-Leucina 1.36 mg, glutamato monosódico 1.36 mg, vit B1 (tiamina clorhidrato) 0.10 mg, vit. B2 (rivoflavina 5 fosfato) 0.04 mg, vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 0.1 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 0.05 mcg, nicotinamida 1.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicado en el tratamiento de estados agudos de convalecencia de animales debilitados o sometidos a esfuerzos intensos, estrés, shock, deshidratación, enfermedades crónicas, parasitosis y como terapia de apoyo en casos de deshidratación severa por vómitos o diarreas donde ayude a reponer la pérdida de electrolitos y proteínas además de la fluidoterapia oral o parenteral.

Dosis y vía de administración

1 mL/5 kg de p.v., entre 1 y 3 veces al día, según la gravedad del caso y criterio facultativo. Aplicar vía intravenosa, intramuscular, subcutáneo o intraperitoneal.

Presentación comercial

Frasco por 100 mL, 250 mL y 500 mL.

Aminoplex® Light

Electrolitos, aminoácidos, vitaminas

Solución inyectable

Fórmula

Dextrosa 50 mg, cloruro de calcio 0.15 mg, cloruro de potasio 0.2 mg, sulfato de magnesio 0.2 mg, acetato de sodio 2.5 mg, hidrocloruro de L-Histidina 0.01 mg, DL-Metionina 0.01 mg, DL-Triptófano 0.01 mg, Hidrocloruro de L-Cisteína 0.01 mg, L-Treonina 0.02 mg, DL-Isoleucina 0.02 mg, hidrocloruro de L-Arginina 0.025 mg, DL-Fenilalanina 0.03 mg, DL-Valina 0.03 mg, hidrocloruro de L-Lisina 0.03 mg, L-Leucina 0.04 mg, glutamato monosódico 0.04 mg, vit. B1 (tiamina clorhidrato) 0.1 mg, vit. B2 (rivoflavina 5 Fosfato) 0.04 mg, vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 0.1 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 0.05 mcg, nicotinamida 1.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Para el rápido restablecimiento de animales convalecientes que han sufrido diarreas, vómitos, deshidratación o enfermedades crónicas. Proporciona al organismo los elementos que se pierden con mayor facilidad en los periodos de deshidratación. Constituye un aporte de energía fundamental en estados carenciales y/o patológicos en los que la ingesta oral se halla disminuida o impedida.

Dosis y vía de administración

2 - 6 mL/kg de p.v., repetir a criterio facultativo. Aplicar vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal.

Presentación comercial

Frasco por 500 mL.

Ascorvet 250

Potente antioxidante

Solución inyectable

Fórmula

Vitamina C 250 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicado en estados carenciales de vitamina C (ácido ascórbico) en perros y gatos, aumenta la resistencia a las enfermedades por medio del fortalecimiento del sistema inmune. Estimula la formación de anticuerpos y mejora la respuesta inmune posvacunal. Promueve la producción de colágeno, protege epitelios, y evita invasión secundaria. Favorece el proceso de cicatrización. Disminuye la inmunosupresión debido al estrés. Actúa como factor antiestrés.

Para animales convalecientes luego de enfermedades infecciosas y parasitarias. Perros: Escorbuto, Moquillo, Parvovirus, gastroenteritis hemorrágicas, ascitis, gingivitis, convalecencia, fatiga muscular. Gatos: Angina infecciosa, astenia.

Dosis y vía de administración

Perros y gatos:1 - 2 mL. Aplicar vía intramuscular o intravenosa.

Presentación comercial

Frasco por 100 mL.

Hepato-Ject®

Hepatoprotector

Solución inyectable

Fórmula

Ácido tióctico (ácido alfa lipoico) 15 mg, ácido orótico 5 mg, DL-Metionina 20 mg, ácido fólico 0.5 mg, nicotinamida 10 mg, D-pantenol 3 mg, piridoxina HCl 2 mg, N-acetil-L-Metionina 50 mg, cloruro de colina 40 mg, inositol 20 mg, betaína HCl 2 mg, vit.B12 (cianocobalamina) 0.04 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Hepatoprotector. Indicado en casos de insuficiencias hepáticas leves o graves, intoxicaciones medicamentosas o como consecuencia de anestesia general, convalecencia, exceso de entrenamiento, falta de apetito, astenia y fatiga habitual. Apropiado en fotosensibilización, casos de hígado graso, hepatitis agudas o crónicas, cirrosis (infecciosas o tóxicas), urticarias y otras enfermedades de origen alimenticio, meteorismo, flatulencias por causas alimenticias y en fotosensibilización.

Dosis y vía de administración

Vía intramuscular y endovenosa lenta, de preferencia diluido en suero. Caninos: 2 - 3 mL/animal. Felinos: 0.2 mL/kg. Volumenes mayores a 10 mL deben ser repartidos.

Presentación comercial

Frasco por 50 mL, 100 mL y 250 mL.

Antiparasitarios

Cesti-Tabs® 10

Antiparasitario interno,
tenicida específico

Tableta oral

Fórmula

Praziquantel 50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infestaciones de todo tipo de parásitos planos como tenias, en estadios inmaduros y adultos; entre estos: *Dipylidium caninum, Taenia* spp. y *Echinococcus granulossus*. Cesti-Tabs® 10 es un arma indispensable para campañas de control y erradicación de hidatidosis.

Dosis y vía de administración

Administrar vía oral a razón de 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo como dosis única.
Cachorros y gatitos: Tratar cada 6 meses; ante un alto riesgo de infestación, puede hacerse en un periodo de cada 3 meses. Hembras preñadas y en lactación: Tratar previo a la monta, una semana antes del parto y a la segunda y cuarta semana después del parto. Para obtener mejores resultados, se debe pesar al perro o gato antes de tratarlo para calcular la dosis adecuada. Considerar que los perros y gatos se reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es necesario llevar a cabo un programa de desparasitación para mantener a los animales libres de estos.

Presentación comercial

Frasco por 30 tabletas.

Fipronex® Spray

Ectoparasiticida para perros y gatos

Solución tópica

Fórmula

Fipronil 2.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Proporciona un control efectivo de pulgas y garrapatas en perros y gatos adultos desde la primera semana de edad. Posee acción adicional contra piojos y sarna sarcóptica (variación *canis*). Controla rápidamente la infestación matando las pulgas adultas antes que se reproduzcan. Previene la reinfestación y elimina rápidamente el estrés en mascotas, resultante de las molestias causadas por las pulgas y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y reacciones alérgicas.
El efecto residual de Fipronex® previene la reinfestación matando las pulgas y garrapatas por un periodo de por lo menos 60 días.

Dosis y vía de administración

Aplicación tópica. A razón de 3 - 6 mL/kg de peso vivo dependiendo del pelaje del animal. El frasco de 55 mL puede ser usado en un animal menor a 18 kg. de peso vivo, el frasco de 110 mL para un animal de menos de 36 kg. de peso vivo y un frasco de 275 mL puede ser usado en un animal de menos de 91 kg. de peso vivo aproximadamente.

Presentación comercial

Spray por 55 mL, 110 mL y 275 mL.

Fipronex® Drop On

Ectoparasiticida en drop on

Solución tópica

Fórmula

Fipronil 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Previene la reinfestación y elimina rápidamente el estrés en mascotas, resultante de las molestias causadas por las pulgas y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y por reacciones alérgicas a las picaduras de las pulgas. Su efecto residual previene la reinfestación, matando las pulgas por un periodo de por lo menos 60 días, y garrapatas por un periodo de 30 días. La protección a perros adultos contra las pulgas puede prolongarse por más de 90 días y por 5 semanas en gatos.

Dosis y vía de administración

Aplicación tópica. Pipeta de acuerdo al peso: Hasta 10 kg de peso vivo: 1 pipeta de 0.67 mL, de 11 a 20 kg de peso vivo: 1 pipeta de 1.34 mL, de 21 a 40 kg de peso vivo: 1 pipeta de 2.68 mL, de 41 a 60 kg de peso vivo: 1 pipeta de 4.02 mL. No bañar ni mojar al animal 2 días antes ni 2 días después al tratamiento.
Aplicación cada 2 meses para el tratamiento y prevención de la infestación por pulgas; y de 30 días para el tratamiento y prevención de la infestación por garrapatas.

Presentación comercial

Caja por 5 pipetas de 0.67 mL, 1.34 mL, 2.68 mL y 4.02 mL.

Fipronex® Duo

Ectoparasiticida con efecto ambiental y prolongado

Solución tópica

Fórmula

Fipronil 2.5 mg, piriproxifen 2.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Fipronex® Duo combina la efectividad del fipronil con piriproxifen, un regulador del crecimiento de los insectos (RCI), ofreciendo una asociación efectiva para el control integral de pulgas y garrapatas en perros desde la primera semana de edad. La adición del piriproxifen, le otorga al producto efectividad residual contra huevos y larvas de pulgas, lo que se traduce en un control ambiental de las pulgas adultas (reducción de la carga ambiental); pues al atacar el ciclo de vida de la pulga en diferentes puntos, evita que las mismas reinfesten la mascota y su medio ambiente. Posee acción adicional contra piojos y sarna sarcóptica (var. *canis*). Altamente eficaz contra pulgas adultas hasta por 90 días (de 60 a 90 días, dependiendo de la carga ambiental) e inhibe el desarrollo de huevos y larvas fértiles (a partir de pulgas adultas) hasta por 120 días. Garantiza además protección total contra todo tipo de garrapatas por un mes con una única dosis.

Dosis y vía de administración

De 3 - 6 mL/ kg de peso vivo dependiendo del pelaje del animal. Aplicación tópica.

Presentación comercial

Spray por 55 mL, 110 mL y 275 mL.

Fipronex® Duo Drop On

Ectoparasiticida con efecto ambiental y prolongado

Solución tópica

Fórmula

Fipronil 100 mg, piriproxifen 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Fipronex® Duo Drop On combina la efectividad del fipronil con piriproxifen, un regulador del crecimiento de los insectos (RCI), ofreciendo una asociación efectiva para el control integral de pulgas y garrapatas en perros. Proporciona un control efectivo de pulgas (*Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Rhiphicephalus sanguineus*) en perros y cachorros desde la octava semana de edad y cuando tenga un peso superior al kilo. Su acción pulguicida es altamente eficaz contra pulgas adultas hasta por 90 días. La adición del piriproxifen inhibe el desarrollo de huevos y larvas fértiles hasta por 120 días, otorgándole al producto una gran efectividad residual, lo que se traduce en un control ambiental de las pulgas adultas (reducción de la carga ambiental); pues al atacar el ciclo de vida de la pulga en diferentes puntos, evita que las mismas reinfesten a la mascota y su medio ambiente. Adicionalmente, posee acción contra piojos y sarna sarcóptica (var. *canis*).

Dosis y vía de administración

Uso externo, para aplicación directa sobre la piel. La dosis varia de acuerdo al peso: Para perros de hasta 10 kg de peso vivo, utilizar 1 pipeta de 0.67 mL, para perros de 11 a 20 kg de peso vivo: 1 pipeta de 1.34 mL, para perros de 21 a 40 kg de peso vivo: 1 pipeta de 2.68 mL, para perros de 41 a 60 kg de peso vivo: 1 pipeta de 4.02 mL. Intervalo entre aplicaciones: Deberá ser no menor a 2 meses para el tratamiento y prevención de la infestación por pulgas y de 30 días para el tratamiento y prevención de la infestación por garrapatas.
El producto puede ser reaplicado a intervalos más cortos, de acuerdo al criterio del médico veterinario.
Importante: En el momento de aplicación evitar el contacto con la boca, ojos, lamido del animal y administrar hasta que la pipeta se encuentre vacía.

Presentación comercial

Caja por 5 pipetas de 0.67 mL, 1.34 mL, 2.68 mL y 4.02 mL.

Fipronex® G5 Spray

Panectocida® por excelencia

Solución tópica

Fórmula

Fipronil 2.5 mg, piriproxifen 2.5 mg, dinotefuran 3.2 mg, butóxido de piperonilo 3 mg, permetrina 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Fipronex® G5 Spray es el primer producto de una categoría nueva, los panectocidas, productos que poseen actividad contra todos los ectoparásitos importantes de los perros. Está indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas, garrapatas, ácaros y piojos en perros; asimismo cuenta con efecto repelente de zancudos o mosquitos, moscas y flebótomos.

Pulgas: Acción adulticida, eficaz sobre *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*. Interfiere en la eclosión de huevos e inhibe la transformación de pulgas inmaduras en adultas. Prevención y tratamiento (junto a otras acciones) de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).

Garrapatas: Acción adulticida, larvicida y repulsiva sobre *Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus* y *Dermacentor reticulatus*.

Piojos: Acción adulticida y lavicida: *Trichodectes canis*.

Acaricida: Sobre *Otodectes cynotis*.

Insectos voladores: Acción repelente/preventiva de picaduras contra flebótomos (*Phlebotomus perniciosus, Lutzomyia peruensis*), mosquitos (*Aedes aegypti, Culex* spp.) y moscas (*Stomoxys calcitrans, Musca doméstica*). Sus componentes han demostrado además un efecto adulticida contra mosquitos (*Aedes aegypti*), flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*) y moscas del establo (*Stomoxys calcitrans*).

Además colabora en la prevención y/o tratamiento de todas las enfermedades y zoonosis transmitidas por ectoparásitos.

Dosis y vía de administración

Dependiendo del pelaje del animal: 3 mL de solución/kg peso vivo. El intervalo de dosificación se realizará según la infestación y el desafío ambiental, esto dependerá del criterio del Médico Veterinario. Un frasco de 55 mL puede ser usado para un perro de hasta 18 kg, un frasco de 110 mL puede ser usado para un perro de hasta 36 kg, un frasco de 275 mL puede ser usado para tratar varios perros (hasta por 90 kg.), un frasco de 550 mL puede ser usado para tratar varios perros (hasta por 180 kg).

Presentación comercial

Frasco por 55 mL, 110 mL, 275 mL y 550 mL.

Fipronex® G5 Drop On

Panectocida® por excelencia

Solución tópica

Fórmula

Fipronil 45 mg, piriproxifen 45 mg, dinotefuran 58 mg, butóxido de piperonilo 10 mg, permetrina 360 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Fipronex® G5 Drop On es el primer producto de una categoría nueva, los panectocidas, productos que poseen actividad contra todos los ectoparásitos importantes de los perros. Está indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas, garrapatas, ácaros y piojos en perros; asimismo cuenta con efecto repelente de zancudos o mosquitos, moscas y flebótomos.

Pulgas: Acción adulticida, eficaz sobre *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*. Interfiere en la eclosión de huevos e inhibe la transformación de pulgas inmaduras en adultas. Prevención y tratamiento (junto a otras acciones) de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).

Garrapatas: Acción adulticida, larvicida y repulsiva sobre *Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus* y *Dermacentor reticulatus*.

Piojos: Acción adulticida y lavicida: *Trichodectes canis*.

Acaricida: Sobre *Otodectes cynotis*.

Insectos voladores: Acción repelente/preventiva de picaduras contra flebótomos (*Phlebotomus perniciosus, Lutzomyia peruensis*), mosquitos (*Aedes aegypti, Culex* spp.) y moscas (*Stomoxys calcitrans, Musca doméstica*). Sus componentes han demostrado además un efecto adulticida contra mosquitos (*Aedes aegypti*), flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*) y moscas del establo (*Stomoxys calcitrans*).

Además colabora en la prevención y/o tratamiento de todas las enfermedades y zoonosis transmitidas por ectoparásitos.

Dosis y vía de administración

Hasta 10 kg pv: 1 pipeta de 1.5 mL; de 10 a 20 kg pv: 1 pipeta de 3 mL; de 20 a 40 kg pv: 1 pipeta de 6 mL; de 40 a 60 kg pv: 1 pipeta de 9 mL; intervalo entre dosis: Para control de pulgas adultas y garrapatas: mensual; para control de huevos de pulgas: 2 meses.

Importante: En el momento de aplicación evitar el contacto con la boca, ojos, lamido del animal y administrar hasta que la pipeta se encuentre vacía.

Presentación comercial

Caja por 5 pipetas de: 1mL, 3mL, 6mL y 9mL.

NextGuard® 4
ProGuard® 4

Antiparasitario palatable de amplio espectro

Pasta Oral

Fórmula
Praziquantel 25 mg, febantel 75 mg, pamoato de pirantel 72 mg, ivermectina 0.03 mg, excipientes c.s.p. 1 mL..

Indicaciones
La combinación antiparasitaria de sus componentes actúa efectivamente contra cestodos (tenias), nematodos (gusanos redondos) y larvas de *Dirofilaria immitis*, en perros y gatos, lo cual le confiere un amplio espectro en infecciones mixtas. Su agradable sabor facilita la dosificación, haciendo que tanto perros como gatos lo ingieran por sí mismos, evitándose el contacto directo con la boca de los animales a tratar.
Por su contenido de praziquantel, es el medicamento de elección en el tratamiento de infecciones por cestodos; administrado en altas dosis es eficaz sobre las etapas inmaduras en el hospedero intermediario; y por su contenido de febantel es el medicamento de elección para el tratamiento de la Giardiasis.

Dosis y vía de administración
1 mL/5 kg de p.v. Administrar vía oral. Los perros y gatos se reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es necesario llevar a cabo un programa de desparasitación.

Presentación comercial
Jeringa dosificadora por 2 mL, 5 mL y 10 mL.

Oxantel® 5

Antiparasitario palatable interno en tabletas

Tableta oral

Fórmula
Oxibendazol 65 mg, praziquantel 37.50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones
Indicado para el tratamiento de infestaciones por cestodes (taenias) y nematodos (gusanos redondos) en perros y gatos. El praziquantel es el antiparasitario de mayor efectividad contra formas, inmaduras y adultas, de todo tipo de taenias . Su amplio espectro tiene gran efectividad total contra: *Echinococcus granulosus, Taenia ovis, T. Hydatigena, T. pisiformis, Dipylidium caninum*, entre otros. Por su parte el oxibendazole es un antihelmíntico de amplio espectro y actúa contra nematodos como: *Toxocara canis, T. Leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala* e inclusive *Trichuris vulpis*.

Dosis y vía de administración
Via oral. 1 tableta/5 kg de peso vivo. Los perros y gatos se reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es necesario llevar a cabo un programa de desparasitación para mantener a los animales libres de estos.

Presentación comercial
Frasco por 50 y 100 tabletas.

Oxantel® Gel

Antiparasitario palatable de espectro múltiple

Suspensión oral

Fórmula

Oxibendazol 65 mg, praziquantel 37.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones mixtas causadas por nematodos: *Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala y Trichuris vulpis* y tenias:*Dipylidium caninum, Taenia* spp. y *Echinococcus granulosus* en caninos y felinos. Es uno de los antiparasitarios más seguros para animales jóvenes y puede usarse también en animales debilitados, viejos y en hembras en cualquier estado de preñez. Posee un agradable sabor por lo que el animal deglute la suspensión sin ningún esfuerzo y total seguridad para el veterinario.

Dosis y vía de administración

Vía oral 1 mL/5 kg de peso vivo, dosis única. No es indispensable ayuno previo al tratamiento. Para obtener mejores resultados, se debe pesar al perro o gato antes de tratarlo y calcular la dosis correcta. Los perros y gatos se reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es necesario llevar a cabo un programa de desparasitación con dosificaciones periódicas.

Presentación comercial

Jeringa dosificadora x 2 mL, 5 mL, 10 mL y frasco de 50 mL.

Profelis® Drop On

Poderoso ectoparasiticida de ultra rápida acción, sólo para gatos

Solución tópica

Fórmula

Dinotefuran 110 mg, fipronil 45 mg, piriproxifen 15 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas, garrapatas, ácaros y piojos en gatos. Acción adulticida en animales infestados y prevención de nuevas infestaciones durante por lo menos un mes. Eficaz sobre *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*. Interfiere en la eclosión de huevos y en la inhibición de la transformación de pulgas inmaduras en adultas, evitando la reproducción de las pulgas durante por lo menos 60 días. Acción contra garrapatas: *Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Ioxedes scapularis, Dermacentor variabilis* y *Dermacentor reticulatus*. Acción piojicida (adultos y larvas): *Felicola subrostratus*. Acción acaricida sobre *Otodectes cynotis*.

Dosis y vía de administración

Uso externo: a razón de 1 mL por animal (con peso mayor a 750 g y edad mayor a las 8 semanas). No se recomienda bañar al animal con champú en las 48 horas siguientes a la aplicación.

Presentación comercial

Caja por 5 pipetas de 1 mL.

Proventis® 10 / 20 / 30

Ectoparasiticida en tabletas palatables
en base de compuestos naturales con efecto ambiental

Tableta oral

Fórmula

Proventis® 10

Cada tableta contiene: spinosad 300.00 mg, lufenuron 100.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Proventis® 20

Cada tableta contiene: spinosad 600.00 mg, lufenuron 200.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Proventis® 30

Cada tableta contiene: spinosad 900.00 mg, lufenuron 300.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

Indicaciones

Antiparasitario externo de efecto dual para perros en tabletas palatables. Posee acción adulticida por su componente natural spinosad, y contiene lufenuron un regulador de crecimiento de insectos (IGR) por el lufenuron; ofreciendo así la asociación más efectiva para el control integral de pulgas y garrapatas en perros y cachorros desde la décimo cuarta semana de edad. La adición del lufenuron le otorga efectividad residual contra huevos y larvas de pulgas, lo que se traduce en un control ambiental de las pulgas adultas, pues al atacar el ciclo de vida en diferentes puntos evita que las mismas re infesten la mascota y su medio ambiente.

Dosis y vía de administración

Administración vía oral.

Proventis® 10

Una tableta por cada 10 kg de peso vivo. Para el control contra garrapatas, debe administrarse a razón de 2 tabletas por cada 10 kg de peso vivo, cada 60 dias.

Proventis® 20

Una tableta por cada 20 kg de peso vivo. Para el control contra garrapatas, debe administrarse a razón de 2 tabletas por cada 20 kg de peso vivo, cada 60 días.

Proventis® 30

Una tableta por cada 30 kg de peso vivo. Para el control contra garrapatas, debe administrarse a razón de 2 tabletas por cada 30 kg de peso vivo, cada 60 dias.

Presentación comercial

Caja por 5 tabletas

Xelamec® Spot On

Endectocida tópico

Solución dérmica

Fórmula

Selamectina 60mg excipientes c.s.p. 1ml

Indicaciones

Antiparasitario para el control y tratamiento de gusanos intestinales, dirofilarias, ácaros de la sarna y del oído, pulgas adultas, larvas y sus huevos, garrapatas y piojos. Indicado en perros y gatos para el tratamiento y prevención de las infestaciones producidas por *Ctenocephalides felis* y puede utilizarse como parte del tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a pulgas. Su actividad adulticida, ovicida y larvicida contra pulgas, rompe efizcamente su ciclo de vida: mata a las formas adultas en la mascota, previene la incubación de huevos en el animal y entorno, como también elimina las larvas del medio ambiente. Xelamec® previene la enfermedad del parásito del corazón producida por *Dirofilaria inmitis*, mediante una administración mensual, y brinda tratamiento y control de la otitis parasitaria producida por *Otodectes cynotis* . En caninos: Controla las infestaciones por garrapatas *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis* (garrapata americana) y piojos masticadores (*Trichodectes canis*). Es empleado para el tratamiento de la sarna sarcóptica causada por *S. scabiei* y para el tratamiento de vermes redondos intestinales adultos (*Toxocara canis*). En felinos: Tratamiento de vermes redondos intestinales adultos (*Toxocara cati*) y vermes intestinales con ganchos (*Ancylostoma tubaeforme*); como también en el tratamiento de piojos masticadores (*Felicola subrotratus*)

Dosis y vía de administración

Uso externo. A razón de 6 mg/kg, lo que equivale:
1 pipeta de 0.25 mL (15 mg de selamectina) hasta 2.5 kg ; 1 pipeta de 0.50 mL (30 mg de selamectina) de 2.6 a 5 kg; 1 pipeta de 1 mL (60 mg de selamectina) de 5.1 a 10 kg; 1 pipeta de 2 mL, (120 mg de selamectina) de 10.1 a 20 kg; 1 pipeta de 4 mL, (240 mg de selamectina) de 20.1 a 40 kg. Se debe aplicar todo el contenido de la pipeta, directamente sobre la piel seca del animal, en la nuca o cruz, sin descargar el contenido sobre el pelo. Puede ser administrado inmediatamente después del baño, una vez seca la piel . El animal puede ser bañado luego de dos horas de la aplicación.

Presentación comercial

Caja por 5 pipetas de: 0.25 mL, 0.50 mL, 1.0 mL, 2.0 mL ó 4.0 mL.

| Antiinflamatorios

Carprodyl® 25

Antiinflamatorio no esteroidal
para perros pequeños y medianos
en tabletas palatables.

Tableta oral

Fórmula

Carprofeno 25 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Antiinflamatorio no-esteroideo (AINE) con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Apropiado para el alivio del dolor y la inflamación asociada al sistema músculo-esquelético en caninos. Ha demostrado ser clínicamente efectivo en el alivio de los signos asociados con la osteoartritis, es recomendado en casos de sinovitis, bursitis, artritis, tendinitis, esguinces, torceduras, subluxaciones sacroilíacas, lesiones traumáticas, poscirugía, entre otras.

Dosis y vía de administración

Vía oral. La dosis recomendada es de 2.2 mg/kg, 2 veces al día, para un total de 4.4 mg/kg/día (1 tableta equivale a 25 mg; por lo que en la práctica se debe administrar 1 tableta por cada 11 kg de peso vivo, 2 veces al día).
La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El médico veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días de comenzada la terapia.

Presentación comercial

Frasco por 40 tabletas.

Carprodyl® 100

Antiinflamatorio no esteroidal
para perros medianos y grandes
en tabletas palatables.

Tableta oral

Fórmula

Carprofeno 100 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Antiinflamatorio no-esteroideo (AINE) con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Apropiado para el alivio del dolor y la inflamación asociada al sistema músculo-esquelético en caninos. Ha demostrado ser clínicamente efectivo en el alivio de los signos asociados con la osteoartritis, es recomendado en casos de sinovitis, bursitis, artritis, tendinitis, esguinces, torceduras, subluxaciones sacroilíacas, lesiones traumáticas, poscirugía, entre otras.

Dosis y vía de administración

Vía oral. La dosis recomendada es de 2.2 mg/kg, 2 veces al día, para un total de 4.4 mg/kg/día (1 tableta equivale a 100 mg; por lo que en la práctica se debe administrar 1 tableta por cada 45 kg de peso, dos veces al día).
La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El médico veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días de comenzada la terapia.

Presentación comercial

Frasco por 20 tabletas.

Vetocam® 50

Antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antitóxico.

Solución inyectable

Fórmula

Meloxicam 5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el alivio de la inflamación y el dolor presente en desórdenes músculo-esqueléticos tanto agudos como crónicos (displasia de cadera, artritis, osteoartrosis, disco espondilitis, entre otros). Para la reducción de la inflamación y dolor posoperatorio presente luego de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos. En procedimientos diagnósticos que generen dolor: Toracocentesis, amniocentesis, etc. En general, en toda patología que curse con dolor, inflamación y/o fiebre, para contrarrestar la acción de las prostaglandinas generadoras de estos síntomas.

Dosis y vía de administración

Caninos: En general 0.2 mg/kg (en la práctica, 0.4 mL/10 kg). Trastornos músculo-esqueléticos: vía subcutánea, 0.2 mg/kg. Reducción del dolor posoperatorio: vía intravenosa o subcutánea, 0.2 mg/kg.
Felinos: En general, 0.3 mg/kg (en la práctica 0.3 mL/5 kg). Reducción del dolor posoperatorio: vía subcutánea, 0.3 mg de meloxicam/kg. Puede usarse antes de la cirugía, por ejemplo en la inducción de anestesia.

Presentación comercial

Frasco por 50 mL, 100 mL y 250 mL.

Anestésicos |

Dormi-Xyl® 2

Sedante, analgésico, anestésico y relajante muscular

Solución inyectable

Fórmula

Xilacina (clorhidrato) 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Acción tranquilizante, analgésica, sedativa y relajante. Su acción está relacionada con la depresión del sistema nervioso central. Produce una marcada sedación y analgesia moderada para intervenciones menores; tranquilización y analgesia moderada para intervenciones quirúrgicas menores y para el manejo de animales indóciles. En intervenciones muy dolorosas es conveniente administrar conjuntamente anestesia por infiltración o regional. Indicado como inductor en el manejo con otros anestésicos como por ejemplo ketamina.

Dosis y vía de administración

Caninos y felinos: 0.15 mL/kg de p.v. vía intramuscular o intravenosa (esta última recomendada en caninos). En caninos, puede asociarse a: lidocaína, hidrato de cloral, barbitúricos (con cuidado), éter, halotano o fluotano, atropina, acepromacina y ketamina. Debido al efecto depresor sobre el sistema nervioso central, deben extremarse las precauciones en el caso de su utilización en animales con severa depresión respiratoria, insuficiencia cardíaca o estado de shock profundo.

Presentación comercial

Frasco por 10 mL, 20 mL y 30 mL.

Ket-A-100®

Anestésico disociativo de acción rápida

Solución inyectable

Fórmula

Ketamina (clorhidrato) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Para la pre-medicación, inducción y mantenimiento de la anestesia. Puede usarse combinado con otras drogas inyectables o inhalatorias, obteniendo un mejor resultado anestésico por bloqueo o en la disminución de efectos colaterales indeseables del uso de la ketamina. Produce inmovilización del paciente por periodos cortos de tiempo lo que permite realizar cirugías pequeñas o procedimientos diagnósticos menores que no requieran de relajación muscular. No causa toxicidad por lo que puede ser usado en caso de cesáreas.

Dosis y vía de administración

Caninos: 5 - 15 mg/kg vía intravenosa o de 15 - 25 mg/kg vía intramuscular (podrá combinarse con atropina, acepromacina y xilazina); felinos: 5 - 8 mg/kg vía intravenosa o de 22 - 33 mg/kg vía intramuscular (podrá combinarse con distintas drogas como atropina, tiopental sódico, acepromacina, nalbufina, midazolam, xilazina).

Presentación comercial

Frasco por 20 mL, 30 mL y 50 mL.

Ket-A-Xyl®

Inductor de la anestesia - combinación de anestésico, tranquilizante y anticolinérgico.

Solución inyectable

Fórmula

Ketamina (clorhidrato) 100 mg, xilacina (clorhidrato) 20 mg, atropina sulfato (monohidrato) 1 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

La combinación ketamina-xilacina ofrece un mejor resultado anestésico por bloqueo o disminución de efectos colaterales indeseables del uso de la ketamina. Indicado en la inducción y mantenimiento de la anestesia en caninos: ovariohisterectomía, castraciones, cesáreas, cirugías en la cavidad abdominal, en cavidad bucal, cirugías oftalmológicas, nariz, oídos; limpieza dental, abscesos, de heridas y de mucosas, entre otras. La adición de atropina evita el aumento de la salivación y otras secreciones excesivas, disminuye el moco bronquial, evita el espasmo laríngeo durante la intubación endotraqueal y previene los efectos bradicardizantes de la ketamina.

Dosis y vía de administración

Vía intramuscular, a razón de 0.5 mL - 1 mL/10 kg (5 mg - 10 mg ketamina /kg, 1 mg -2 mg xilacina/kg y 0.05 mg - 0.1 mg atropina/kg). El tiempo de acción se presenta luego de 5 a 15 minutos después de la dosificación. Para mantener el efecto anestésico durante la cirugía, se recomienda usar dosis de ketamina sola.

Presentación comercial

Frasco por 20 y 30 mL.

Penta-Hypnol®

Anestésico general barbitúrico

Solución inyectable

Fórmula

Pentobarbital sódico 65 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Anestésico barbitúrico de corta acción. Indicado como sedante y anestésico en caninos y felinos. Está indicado como anestésico general en intervenciones quirúrgicas de hasta dos horas de duración. A altas dosis es considerado eutanásico, induciendo parálisis bulbar inhibiendo totalmente el centro respiratorio. Indicado además para el manejo de estados convulsivos causados por: envenenamiento (p.e. por estricnina, insecticidas clorados, organofosforados, atropina), eclampsia puerperal, epilepsia, entre otros.

Dosis y vía de administración

Caninos y felinos: Se administra a razón de 1 mL/2.5 kg. Como sedante: 1.5 mL/5 kg. Aplicar vía intravenosa.

La dosis indicada podrá variar de acuerdo al criterio del profesional y en especial en consideración al tamaño, edad, y salud del animal. Es importante tener en cuenta el grado variable de susceptibilidad y reacciones de cada paciente en particular.

Presentación comercial

Frasco por 50 mL.

Suprivan®

Anestésico hipnótico de corta acción para uso intravenoso

Emulsión inyectable

Fórmula

Propofol 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Está indicado como anestésico general en procedimientos quirúrgicos de periodos cortos en perros y gatos. En cirugías de larga duración puede usarse para inducir y mantener la anestesia con infusiones continuas de la droga. En caso de uso de anestesia inhalatoria, puede utilizarse como inductor de la anestesia general para la entubación endotraqueal. Puede usarse como anestésico en caso de diagnóstico ambulatorio o procedimientos menores (reparación de laceraciones, procedimientos radiológicos, odontología menor, biopsias menores, endoscopia, entre otros). Adicionalmente puede ser administrado para el tratamiento del estado refractario epiléptico.

Dosis y vía de administración

Administrar únicamente por vía inyectable intravenosa. La dosis de inducción en perros cuando no se usa un preanestésico es de 5.5 a 7.0 mg/kg (en la práctica 1 mL/1.4 a 1.8 kg), mientras que en gatos es de 8 a 13.2 mg/kg (en la práctica 1 mL/0.75 a 1.25 kg).Las dosis con diferentes preanestésicos xilacina, acepromacina, medetomidina, ketamina entre otros se reducen drásticamente. Otras especies animales: entre 2 y 15 mg/kg.

Presentación comercial

Frasco por 20 mL, 30 mL y 50 mL.

Vetocaína A2

Anestésico local

Solución inyectable

Fórmula

Lidocaína clorhidrato 20 mg, adrenalina bitartrato 0.04 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Anestésico local recomendado para aplicaciones clínicas como: anestesia por infiltración (epidural o paravertebral) en cesáreas, cortes de cola, castraciones y otras intervenciones en zona genital; anestesia conductiva, bloqueo nervioso (como de los nervios intercostales, mandibular y del plexo braquial) y subaracnoideo; como infiltración intraarticular para controlar el dolor clínico y como anestésico local con fines diagnósticos y exploratorios. La adrenalina le otorga un efecto antihemorrágico al momento de la cirugía; además brinda un prolongado efecto anestésico a la lidocaína disminuyendo los efectos colaterales. Puede usarse cuando se requiera de una vasconstricción periférica, especialmente en cirugías.

Dosis y vía de administración

Anestesia de infiltración: En casos de administración repetida, el volumen total administrado no debe exceder 0.5 mL/ kg., gatos: 1 mL, perros: 1 - 2 mL. Anestesia epidural: Para cirugía en animales recostados: Animales pequeños: 1.5 mL por cada 10 cm de longitud de la columna vertebral (administración lenta).

Presentación comercial

Frasco por 100 mL.

Otros |

Adrena-Vida®

Vasoconstrictor potente para tratamiento del shock anafiláctico

Solución inyectable

Fórmula

Adrenalina (como bitartrato) 1 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

La adrenalina produce un aumento de la presión sanguínea, estimulando directamente el miocardio, con lo cual aumenta la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción. La musculatura gastrointestinal se relaja y disminuye la amplitud y frecuencia de las contracciones intestinales automáticas espontáneas, a la vez que los esfínteres pilórico e ileocecal se contraen. La adrenalina produce además vasoconstricción en piel, mucosas y riñones. Los músculos bronquiales se relajan. Adrena-Vida® es un vasoconstrictor potente de acción inmediata para uso de emergencia en el tratamiento del shock anafiláctico. También puede usarse cuando se requiera una vasoconstricción periférica. Tratamiento de reacciones de hipersensibilidad tipo I (shock anafiláctico). En heridas abiertas o abrasiones de la piel puede aplicarse directamente para inducir hemostasia. En intervenciones quirúrgicas muy sangrantes como vasoconstrictor periférico.

Dosis y vía de administración

Aplicar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.
Caninos y felinos: 0.1 - 0.5 mL/animal.

Presentación comercial

Frasco por 50 mL.

Diuride® 500

Diurético y salurético

Solución inyectable

Fórmula

Furosemida 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Tratamiento de edemas inflamatorios y no inflamatorios. Es ideal para el tratamiento de todo tipo de estados edematosos. La furosemida es un compuesto ortoclorosulfonamidado que posee un grupo carboxílico adicional que lo diferencia de las tiazidas y ejerce una acción muy activa sobre el transporte de sodio, posiblemente debido a su naturaleza extremadamente acídica.
Indicado para la reducción de edemas y ascitis, como coadyuvante en la eliminación de acumulaciones de líquidos patológicos inflamatorios y no inflamatorios, tisulares y cavitarios, a través de la orina. Indicado en el tratamiento del edema grave: edema pulmonar y bronquial, cerebral, de la ubre (edema fisiológico y patológico), del escroto y prepucio, extremidades ehipostático (por postración). En casos de ascitis, insuficiencia cardiaca congestiva, hidrotórax o hidropericardio. En nefropatía por cálculos y uremia.

Dosis y vía de administración

Aplicar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. 0.5 - 1 mL/10 kg de p.v.

Presentación comercial

Frasco por 20 mL, 50 mL y 100 mL.

Hemostop® K

Antihemorrágico vasotrópico
con factor procoagulante

Solución inyectable

Fórmula

Sulfonato sódico de carbazocromo 5 mg, vit. K3 (menadiona sodio bisulfito) 10 mg, excipientes c.s.p.1 mL.

Indicaciones

Hemostático parietal selectivo de los vasos dañados y regulador de los niveles de protrombina. Hemostop® K está indicado para la prevención y tratamiento de las hemorragias en el pre, trans y posoperatorio por reducción de la resistencia de los vasos capilares. En deficiencias de vitamina K3 causantes de hemorragias y en intoxicaciones con inhibidores de la vitamina K tales como coumarina y sus derivados (indandiona, brodifacouma). En el tratamiento de la hematurias, melenas, hematemesis, hemoptisis, metropatías hemorrágicas, hemorragias *post-partum* y *post-abortum*, púrpuras trombopénicas y vasculares, gingivorragias, equimosis, epistaxis y petequias. Extracciones dentarias, hemorragias quirúrgicas y traumáticas.

Dosis y vía de administración

Vía intramuscular, subcutánea o intravenosa (esta última debe utilizarse diluida). Caninos y felinos: 1 mL/5 kg de p.v. Tratamiento 2 veces al día, por 4 a 6 días. Otras dosis pueden utilizarse de acuerdo a criterio profesional.

Presentación comercial

Frasco por 20 mL y 50 mL.

Hemo-Stop® Tabs

Antihemorrágico, hemostático
plaquetario con factor antifibrinolítico

Tabletas recubiertas

Fórmula

Etamsilato BP 250.00 mg, ácido tranexamico 250.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias. Control de la hemostasia en procesos traumáticos, quirúrgicos, patológicos y manipulaciones obstétricas. Profilaxis hemorrágica pre, trans y post quirúrgica, especialmente en ginecología, urología y odontología. Control de la hemorragia uterina disfuncional, coadyuvante en el tratamiento de trastornos de la coagulación y prevención de hemorragias de pequeños vasos sanguíneos, hematuria, melena, hematemesis, epistaxis, parvovirosis, auriculohematomas, caudotomía, auriculotomía, metroragias, elitrorragias, oncotomías, intoxicación por AINEs, perforación de úlcera gástrica y duodenal, peritonitis traumática, equimosis, púrpura.

Dosis y vía de administración

Vía oral. 1/2 tableta por 10 a 12.5 kg cada 6 a 8 horas hasta que el efecto deseado sea alcanzado. Administrar por 1 a 5 días, hasta controlar el sangrado o a criterio del médico veterinario. En cirugía: Preoperatorio: 1 hora antes. En Poscirugía: cada 6 a 8 horas mientras persista el riesgo de hemorragia.

Presentación comercial

Caja por 30 tabletas.

VentoCardyl®

Analéptico cardiorrespiratorio

Solución inyectable

Fórmula

Heptaminol clorhidrato 100 mg, diprofilina (difilina) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Analéptico cardiorrespiratorio. Está indicado en todos los casos de insuficiencias cardíacas y/o respiratorias, para revertir los efectos de neurolépticos y de otros anestésicos sobre el músculo cardíaco y sobre la función respiratoria. Indicado en casos de mal de altura, reanimación de recién nacidos, para revertir los efectos de neurolépticos y otros anestésicos, tos cardíaca, colapso, falla cardíaca, isquemia miocárdica, deficiencia circulatoria, hipotensión, miocarditis, insuficiencia venosa, astenia, cansancio y como desfatigante no específico. Como broncodilatador está indicado en casos de enfermedad obstructiva de las vías aéreas (cuando es reversible). También es utilizada como tratamiento concomitante en desórdenes del tracto respiratorio, disnea (asociada a la congestión y el edema de pulmón, como terapia adicional), edema pulmonar.

Dosis y vía de administración

Aplicar vía intravenosa, intramuscular o intraperitoneal. 1 mL/10 kg de peso vivo. De ser necesario puede repetir la dosis cada 4 - 5 días.

Presentación comercial

Frasco por 50 mL y 100 mL.

Vetactin®

Potente estimulante del apetito

Solución oral

Fórmula

Citrato de tricolina 55 mg, ciproheptadina HCl 0,4 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Tónico general, estimulante del apetito, de la función hepática y la secreción de jugos digestivos. Favorece la síntesis proteica y el desarrollo muscular. Proporciona una acción orexigénica y hepatoprotectora, promoviendo el aumento de peso y mejorando la síntesis de proteínas. En trastornos hepatobiliares asociados con la anorexia y otras condiciones que requieran un aumento en la ingesta voluntaria de alimentos. Coadyuvante de tratamientos posoperatorios, traumáticos y de enfermedades que cursen con disminución del estado general del animal. Fatiga física, falta de desarrollo, debilidad muscular. Como complemento a regímenes anti-tuberculosos, cancerígenos y antirretrovirales.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Perros: 1 mL/2 kg cada 12 horas. Gatos: 2 - 4 mL/animal una a dos veces al día, directamente en el hocico del animal 2 horas antes de su alimento. El efecto del producto se manifestará luego de tres días de iniciado el tratamiento. La duración de la administración y dosis diferentes a las indicadas, dependerán, de la respuesta a la medicación y al criterio del médico veterinario tratante.

Presentación comercial

Frasco por 100 y 200 mL

Nutrovet®

Nutrovet® propone formulaciones nutricionales innovadoras para suplementar la dieta de las mascotas, enfocándose en el balance necesario para un óptimo desarrollo y crecimiento, la protección de la integridad intestinal y estimulante de la inmunidad.

Artrosamine®

Condroprotector para huesos
y articulaciones

Tableta oral

Fórmula

Glucosamina clorhidrato 600 mg, condroitina sulfato 300 mg, ácido hialurónico 5 mg, N-acetil D-glucosamina 60 mg, metil sulfonil metano (MSM) 100 mg, DL-Metionina 110 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Coadyuvante en el tratamiento de la osteoartritis y problemas de articulaciones en perros. Funciona como un condroprotector ayudando a la regeneración de cartílagos articulares y a lubricar articulaciones dañadas por envejecimiento, traumas, infecciones o displasia de cadera. Promueve las articulaciones sanas durante el crecimiento, alivia el dolor, ayuda en la regeneración de tendones y articulaciones, auxiliar en problemas lumbares y de artritis, facilita la movilidad de los animales afectados, puede ser usado como terapia de soporte de por vida en perros de cualquier edad.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Caninos hasta 10 kg de peso vivo: 1 tab/día; de 10 a 20 kg de peso vivo: 2 tab/día; de 20 a 40 kg de peso vivo: 3 tab/día; más de 40 kg de peso vivo: 4 tab/día, durante 4 a 6 semanas o según recomendación del médico veterinario. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. Su agradable sabor facilita la administración vía oral.

Presentación comercial

Frasco por 60 tabletas.

Cani-Tabs® Daily Multi Puppy

Suplemento multielemental
para cachorros en tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Vit. A 1000 IU, vit. D3 100 IU, vit. E 5 IU, vit. K1 120 ug, vit. B1 0.75 mg, vit. B2 0.75 mg, vit. B6 0.30 mg, vit. B12 30 ug, nicotinamida 4.50 mg, cloruro de colina 0.25 mg, vit. C 15.00 mg, taurina 25.00 mg, glicina 9.00 mg, ácido aspártico 9.00 mg, prolina 9.00 mg, serina 9.00 mg, lisina 9.00 mg, metionina 9.00 mg, cisteina 9.00 mg, treonina 9.00 mg, magnesio 1.00 mg, hierro 1.25 mg, cobre 14.00 ug, zinc 0.75 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicado para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros. La vitamina A y E son esenciales para la salud de la piel. La vitamina D es necesaria para la correcta absorción de calcio y fósforo. La vitamina E es un potente antioxidante. La vitamina K previene las anemias hemorrágicas. La vitamina C ayuda al sistema inmune. El zinc, magnesio, hierro y cobre son minerales importantes en varias reacciones biológicas. Las vitaminas del complejo B mantiene saludable el sistema nervioso, hígado y músculos. La taurina contribuye al desarrollo del sistema cardiovascular.

Dosis y vía de administración

1 tableta diaria, vía oral. Puede ser administrado directamente por su alta palatabilidad antes de las comidas o desintegrándolas y mezclándolas con las mismas.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Cani-Tabs® Daily Multi Adult

Suplemento multielemental para perros adultos en tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Vit.A 1500 IU, vit.D3 150 IU, vit. E 15 IU, vit. B1 0.50 mg, vit. B2 0.50 mg, vit. B6 0.25 mg, vit. B12 30 ug, nicotinamida 10.00 mg, vit. C 10.00 mg, taurina 10.00 mg, glicina 10.00 mg, ácido aspártico 10.00 mg, prolina 10.00 mg, serina 10.00 mg, lisina 10.00 mg, metionina 10.00 mg, cisteina 10.00 mg, treonina 10.00 mg, magnesio 1.80 mg, hierro 1.50 mg, cobre 0.05 mg, manganeso 0.12 mg, zinc 0.75 mg, yodo 25.00 ug, potasio 7.00 mg, excipientes q.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicado para alcanzar las necesidades nutricionales de los perros adultos. Las vitamina A y E son esenciales para la salud de la piel. La vitamina D promueve una correcta absorción de calcio y fósforo. La vitamina E es un potente antioxidante. La vitamina K previene las anemias hemorrágicas. La vitamina C ayuda al sistema inmune. El zinc, magnesio, hierro y cobre son minerales importantes en varias reacciones biológicas. El complejo B mantiene saludable el sistema nervioso, hígado y músculos. La taurina contribuye al desarrollo del sistema cardiovascular.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Perros de menos de 9 kg: 1/2 tableta diaria, de más de 9 kg: 1 tableta diaria. Puede ser administrado directamente o desintegrándolas y mezclándolas con las comidas.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Cani-Tabs® Daily Multi Senior

Suplemento multielemental para perros geriátricos en tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Vit. A 1500 IU, vit. D3 75 IU, vit. E 25 IU, vit. K1 100 ug, vit. B1 4.00 mg, vit. B2 2.00 mg, vit. B6 2.00 mg, vit. B12 150 ug, nicotinamida 5.50 mg, pantotenato de calcio 3.50 mg, ácido fólico 0.01 mg, biotina 1.50 ug, vit. C 15.00 mg, colina 0.01 mg, taurina 22.50 mg, inositol 4.00 mg, glicina 6.50 mg, ácido aspártico 6.50 mg, prolina 6.50 mg, serina 6.50 mg, lisina 6.50 mg, metionina 6.50 mg, cisteína 6.50 mg, treonina 6.50 mg, magnesio 5.00 mg, hierro 2.00 mg, cobre 0.05 mg, manganeso 0.50 mg, zinc 1.00 mg, yodo 25.00 ug, potasio 7.50 mg, selenio 2.50 ug, cromo 2.50 ug, excipientes c.s.p 1 tableta.

Indicaciones

Indicado para alcanzar las necesidades nutricionales de los perros de edad avanzada. La vitamina A y E son esenciales para la salud de la piel. La vitamina D promueve una correcta absorción de calcio y fósforo. La vitamina E es un gran antioxidante. La vitamina K previene las anemias hemorrágicas. La vitamina C ayuda al sistema inmune. El zinc, magnesio, hierro y cobre son minerales importantes en varias reacciones biológicas. El complejo B mantiene saludable el sistema nervioso, hígado y músculos.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Perros de menos de 9 kg: 1/2 tableta diaria; perros de más de 9 kg: 1 tableta diaria.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Cani-Tabs® Healthy Bones Ca +P

Huesos y dientes sanos
Tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Calcio 300 mg, fósforo 200 mg, magnesio 2.5 mg, vit. D3 300 UI, vit. C 25.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

Indicaciones

Previene la deficiencia de los componentes presentes en la fórmula, ayuda a fortalecer los huesos y las articulaciones, aportando la cantidad óptima diaria de calcio, fósforo y vitamina D. Ideal para períodos de rápido crecimiento, gestación y lactación. Cachorros: Promueve el crecimiento y desarrollo normal de huesos, articulaciones y dientes sanos. Adultos: Mantiene huesos fuertes y los dientes sanos, promueve una adecuada gestación y lactación. Seniors: Atrasa el deterioro de huesos y dientes.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Mantenimiento de perros adultos: 1/2 tableta por 10 kg de peso vivo/día. Cachorros en crecimiento y hembras en gestación o lactación: 1 tableta /10 Kg de peso vivo/día. Perros mayores a 30 kg: no más de 3 tabletas diarias. Mantenimiento de gatos adultos: 1/4 tableta por 2 kg de peso vivo/día. Gatitos en crecimiento y hembras en gestación o lactación: 1/2 tableta por 2 kg de peso vivo/día. Gatos mayores a 3 kg: no más de 1 tableta diaria. Esta administración aporta el 60% de la recomendación diaria de calcio, y fósforo para gatos.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Cani-Tabs® Hip + Joint Mini

Condroprotector y antioxidante para perros de raza pequeña en tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Glucosamina HCl 125.00 mg, sulfato de condroitina 22.50 mg, metil sulfonil metano (MSM) 125.00 mg, vit. D3 100.00 UI, calcio 120 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicado para mejorar y prevenir problemas articulares y falta de movimiento, favoreciendo la regeneración del cartílago en perros de razas pequeñas (hasta 10 kg). Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades articulares como la artritis y la osteoartritis de diversa etiología, entre otros. Ayuda a aliviar el dolor articular en perros mayores y / o heridos. La glucosamina es un componente fundamental para la formación de la superficie articular, tendones, ligamentos, tejido sinovial, piel, huesos y válvulas cardiacas, entre otros. Sulfato de condroitina es uno de los principales componentes del cartílago. Alivia la sintomatología articular. MSM contribuye a la regeneración del tejido conjuntivo y el colágeno que facilita la movilidad y el funcionamiento normal de la articulación. El calcio es esencial para los huesos y la vitamina D es importante para su mejor uso.

Dosis y vía de administración

Perros hasta 10 kg de peso: 1 tableta diaria. Administrar vía oral.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Cani-Tabs® Hip + Joint M&L

Condroprotector y antioxidante
para perros de raza mediana y grande
en tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Glucosamina HCl 600 mg, sulfato de condroitina 200 mg, metil sulfonil metano (MSM) 200 mg, vit. A 500 UI, vit. D3 50 UI, vit. E 1 UI, vit. B1 0.41 mg, vit. B2 0.50 mg, vit. B6 0.05 mg, vit. B12 0.25 mcg, nicotinamida 5 mg, calcio 39 mg, fósforo 30 mg, potasio 1.65 mg, cloro 1.50 mg, magnesio 2 mg, hierro 1.50 mg, cobre 0.05 mg, manganeso 0.13 mg, zinc 0.50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicado para mejorar y prevenir problemas articulares y falta de movimiento, favoreciendo la regeneración del cartílago en perros de raza mediana y grande. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades articulares como la artritis y la osteoartritis de diversa etiología, entre otros. Alivia el dolor articular en perros mayores y / o heridos. Contiene una mezcla de vitaminas y minerales importante para las articulaciones, regula la respuesta inflamatoria, provee protección contra los radicales libres, entre otros.

Dosis y vía de administración

Se recomienda administrar en forma diaria durante 30 días: 1/2 tab/5 kg de peso vivo; 1 tab/10 kg de peso vivo. Administración vía oral. La dosis y el periodo de tratamiento pueden variar según criterio del médico veterinario. Puede ser administrado directamente o desintegrándolas y mezclándolas con las comidas.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Cani-Tabs® Immunity & Allergies

Inmunidad fortalecida - antioxidante
antialérgico y antiestrés natural en
tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Quercetina 37.50 mg, calostro 25.00 mg, extracto de *Vaccinium myrtillus* (arándanos) 25.00 mg, extracto de *Camellia sinensis* (té verde) 25.00 mg, extracto de *Fragaria vesca* (fresas) 25.00 mg, extracto de *Curcuma longa* (cúrcuma) 25.00 mg, zinc 5.00 mg, vit. A 450.00 UI, vit. E 15.00 UI, vit. C 40.00 mg, excipientes c.s.p.1 tableta.

Indicaciones

Asociación de antioxidantes y bloqueadores histamínicos naturales con efecto sobre la producción y liberación de mediadores de inflamación y alergias, sobre las enfermedades autoinmunes y regulación de la carga viral. Aporta inmunoglobulinas que proveen inmunidad pasiva inmediata y favorece un funcionamiento óptimo del sistema inmunitario. Para el soporte del sistema inmune en casos de vacunación y enfermedad aguda o crónica, como antioxidante para reducir la sensibilidad al estrés ambiental y el paso de edad y como coadyuvante en procesos alérgicos de cualquier índole.

Dosis y vía de administración

Perros de hasta 5 kg de peso: 1-2 tabletas diaria. Perros de 5 a 25 kg: 3-4 tabletas diarias. Perros de más de 25 kg de peso: 5-6 tabletas diarias como dosis máxima. Usar por 12 semanas, semana por medio para iniciar otro período. Administrar vía oral.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas

Cani-Tabs® Omega 3 EPA & DHA

Antialérgico - antiestrés natural
regenerador de piel - inmunidad fortalecida

Cápsula blanda oral

Fórmula

Omega 3 (proporcionando EPA 180 mg y DHA 120 mg) 1000 mg, excipientes c.s.p.1 cápsula.

Indicaciones

Suplemento de aceite de pescado que contiene una fuente pura de ácidos grasos. Omega 3, un antioxidante que ayuda a prevenir la formación de radicales libres que causan daños a las células de los órganos en el cuerpo. Promueve la salud óptima para las articulaciones, el corazón, el cerebro y los ojos. Ayuda a prevenir los radicales libres que causan daños a las células de los órganos en el cuerpo. Actúa como soporte en el sistema cardiaco, renal y neurológico. En cachorros, promueve un mejor desarrollo del cerebro, sistema nervioso y estimula el aprendizaje temprano. En perros adultos, interviene en el funcionamiento adecuado del sistema renal, controla el colesterol y triglicéridos. En perros de edad avanzada, participa en el correcto funcionamiento del corazón y mantenimiento del sistema renal.

Dosis y vía de administración

Vía oral. 1 cápsula por cada 23 kg o fracción, en forma diaria. Se recomienda administrar de manera entera debido a que la cubierta de la cápsula protege al ácido graso Omega-3 del daño potencial producido por los ácidos del estómago y permite su adecuada liberación y absorción en el intestino delgado.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 cápsulas.

Cani-Tabs® Skin + Coat

Pelo brillante - recuperación de piel
y manto - uñas sanas en tabletas
palatables

Tableta oral

Fórmula

Biotina 1.00 mg, zinc 5.00 mg, vit. A 800.00 UI, vit. D3 50.00 UI, vit. E 15.00 UI, metionina 18.75 mg, lisina 18.75 mg, treonina 18.75 mg, glicina 18.75 mg, ácido aspártico 18.75 mg, prolina 18.75 mg, serina 18.75 mg, cisteína 18.75 mg, colina 30.00 mg, excipientes c.s.p.1 tableta.

Indicaciones

Suplemento nutricional que garantiza suplir las necesidades vitamínicas y minerales de su mascota, mejora la salud de la piel, pelo y uñas. La asociación de biotina, zinc, vitamina A, metionina y otros aminoácidos y vitaminas, promueve el desarrollo saludable de la piel y la calidad y brillo del pelaje. Promueve además, la formación de queratina para las uñas. Su uso durante la muda acelera la velocidad del reemplazo del manto. Cachorros: Promueve el crecimiento saludable del pelaje, piel y uñas. Adultos: Recuperación de la piel. Acelera la muda. Seniors: para aplazar síntomas de la edad en piel, pelo y uñas.

Dosis y vía de administración

Suplemento diario oral. Por su alta palatabilidad, puede ser administrado directamente antes de las comidas o desintegrándolas y mezclándolas con las mismas. Perros de menos de 5 kg de peso: 1 tableta diaria. Perros de 5 a 25 kg: 2 tabletas diaria. Perros de más de 25 kg de peso: 3 tabletas diaria como dosis máxima

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas

Cani-Tabs® UT Support

Desarrollo y salud del sistema urinario en tabletas palatables

Tableta oral

Fórmula

Extracto de *Serenoa repens* (palmito salvaje) 25.00 mg, extracto de *Vaccinium myrtillus* (arándanos) 125.00 mg, extracto de semillas de *Cucurbita pepo* (calabaza) 75.00 mg, extracto de *Ipomoea batatas* (camote o batata) 50.00 mg, vitamina B6 (piridoxina) 5.00 mg, vitamina C 50.00 mg, manitol 10.00mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

Indicaciones

Suplemento nutricional para mantener el funcionamiento y desarrollo saludables del tracto urinario. Remueve y previene la adherencia de ciertas bacterias responsables de las principales infecciones urinarias y de la vejiga en particular. Fortalece la inmunidad y reduce el riesgo de infecciones urinarias y cálculos renales o vesicales. Como soporte en caso de enfermedades y cirugía de la próstata y del tracto genito-urinario, incluyendo riñones y vejiga. Alivio de membranas inflamadas e irritadas e incontinencia urinaria.

Dosis y vía de administración

Suplemento diario oral. Por su alta palatabilidad, puede ser administrado directamente antes de las comidas o desintegrándolas y mezclándolas con las mismas. Perros de menos de 5 kg de peso: 1 tableta diaria. Perros de 5 a 25 kg: 2 tabletas diaria. Perros de más de 25 kg de peso: 3 tabletas diaria como dosis máxima.

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

FH-10 Factor Hepático 10

Acción hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Solución oral

Fórmula

L-Carnitina (L-Cartinina clorhidrato) 5000 mg, silimarina 2000 mg, extracto de alcachofa 2000 mg, DL-Metionina 2000 mg, cloruro de colina 7 500 mg, betaína (betaína clorhidrato) 1000 mg, L-Lisina (L-Lisina clorhidrato) 2000 mg, N-Acetil-L-Metionina 1000 mg, magnesio (como sulfato) 1010 mg, sorbitol 20 000 mg, excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Soporte en terapias de patologías que afecten el normal funcionamiento del hígado: infecciones virales o bacterianas, parasitismos graves, hepatitis dietética, hepatitis inducida por medicamentos y otras formas de hepatitis tóxicas, hígado graso, cirrosis, colecistitis, irritación hepática por ingestión de alimentos nocivos, intoxicaciones en general, disfunciones gastrointestinales de diversa etiología entre otras. También puede ser utilizado como estimulante del apetito en pacientes convalecientes de enfermedades consuntivas. Protege y mejora el funcionamiento de los sistemas enzimáticos que pueden metabolizar y eliminar productos tóxicos.

Dosis y vía de administración

Perros y gatos. Vía oral 1mL/2.5-5kg de p.v. durante 5-7 días, equivalente a 20 gotas/2.5-5 kg, una vez al día como dosis preventiva y 3 veces al día como dosis terapéutica.

Presentación comercial

Gotero por 30 mL.

Nutromix®

Suplemento nutricional balanceado

Gel oral

Fórmula

Cada 6 g de Nutromix® contiene: calcio 0.16 mg, fósforo 0.02 mg, potasio 0.15 mg, sodio 1.01 mg, cloro 0.33 mg, magnesio 0.38 mg, hierro 0.53 mg, manganeso 0.95 mg, yodo 0.48 mg, vitamina A 734 UI, vitamina D3 55 UI, vitamina E 5 UI, tiamina (vitamina B1) 1.52 mg, ribloflavina (vitamina B2) 0.011 mg, ácido pantoténico (vitamina B5) 1.74 mg, niacina (vitamina B3) 1.90 mg, piridoxina (vitamina B6) 0.73 mg, ácido fólico (vitamina B9) 0.19 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 1.83 ug, excipientes: extracto de malta 2.22 g, preservantes c.s.p. 6 g.

Indicaciones

Suplemento nutricional balanceado de alta digestibilidad, que provee proteinas, grasas, vitaminas y minerales necesarios para la salud y la nutrición adecuada de los animales de compañia. Además contiene dentro de su formulación extracto de malta la cual proporciona fibra y gran patabilidad. Indicado en caninos y felinos que requieren un aporte extra de energía y vitaminas en la dieta, ayuda a aumentar la ingesta alimentaria en los animales, sobre todo aquellos que sufren de falta de apetito o desnutrición suprimida. También puede ser usado en pacientes en convalecencia postoperatoria, como adyuvante en enfermedades infecciosas (bacterianas o virales), parasitarias e inflamatorias. Indicado tambien como soporte en periodos de gestación, lactancia, crecimiento y estrés; como también en animales geriátricos, animales debilitados y/o anoréxicos.

Dosis y vía de administración

Administrar vía oral. Coloque una pequeña porción de Nutromix® en la boca del paciente para que pueda reconocer el sabor del gel. Como complemento dietético administre de ½ a 2 cucharaditas por cada 5 kg de peso vivo diariamente. Como suplemento energético se recomineda dosificar 3 cucharaditas por cada 5 kg de peso vivo diariamente. Es de muy fácil administración por su alta palatabilidad. Para una mayor referencia 1 cucharadita equivale a 5 mL.

Presentación comercial

Tubo colapsible por 60 y 120 g.

Petonic® Recuperation

Fórmula nutracéutica de recuperación para perros

Solución oral palatable

Fórmula

Vit. A (como retinol palmitato) 250 000 UI, vit. D3 (como colecalciferol) 50 000 UI, vit. E (como alfa tocoferil acetato) 375 mg, vit. K3 (como menadiona sodio bisulfito) 25 mg, vit. B1 (como tiamina clorhidrato)350 mg, vit. B2 (como riboflavina 5 sodio fosfato) 400 mg, vit. B3 (como nicotinamida) 1 000 mg, vit. B5 (como pantotenato de calcio) 1 500 mg, vit. B6 (como piridoxina clorhidrato) 200 mg, vit. B7 (biotina) 0.2 mg, vit. B9 (como ácido fólico) 25 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 1 mg, vit. B15 (pangamato sódico) 0.1 mg, vit. BH (como inositol) 0.3 mg, DL-Metionina 500 mg, L-Lisina (como clorhidrato) 250 mg, L-Treonina 50 mg, L-Triptofano 7.5 mg, L-Histidina (como clorhidrato) 90 mg, L-Arginina (como clorhidrato) 49 mg, L-ácido aspártico 145 mg, L-Serina 68 mg, ácido glutámico 116 mg, L-Prolina 51 mg, glicina 57.5 mg, L-Alanina 97.5 mg, L-Cisteína (como clorhidrato) 15 mg, L-Valina 110 mg, L-Leucina 115 mg, L-Isoleucina 12.5 mg, L-Tirosina 34 mg, L-Fenilalanina 81 mg, nucleótidos 500 mg, ácidos grasos esenciales 50 mg, selenito de sodio 12.5 mg, yoduro de potasio 50 mg, gluconato de cobalto 50 mg, cobre-edetato 20 mg, manganeso-edetato 100 mg, zinc-edetato 300 mg, hierro-edetato 21 mg, cloruro de sodio 1 000 mg, cloruro de potasio 825 mg, sulfato de magnesio 45.5 mg, ácido cítrico 300 mg, excipientes c.s.p. 100 mL

Indicaciones

Soporte para la recuperación de animales pos-cirugía, animales enfermos, débiles o de edad avanzada y como promotor de la salud para cachorros. Indicaciones específicas: Situaciones de estrés catabólico: anoréxicas, posquirúrgicas, geriátricas, animales débiles o exhaustos. Soporte a pacientes con IG (p.e.parvovirosis), pancreatitis, insuficiencia renal crónica, problemas hepáticos u otras indicaciones. Dificultad o problemas para comer o beber en períodos de recuperación. Perros que se rehusan a comer luego de cirugías o dietas terapeúticas. Antibioterapias prolongadas, deshidratación y coadyuvante en casos de enfermedades, infecciones e intoxicaciones. Es indicado también como suplemento integral en animales recién nacidos, debido a que mejora la respuesta a la inmunización y como refuerzo nutricional pos-vacunal en cachorros. Debido a su alta palatabilidad, facilita la administración de medicamentos y suplementos. Además promueve el consumo en mascotas que no beben suficiente agua y en consecuencia, puedan sufrir de cálculos urinarios.

Dosis y vía de administración

Vía oral, directamente, con el alimento o en el agua de bebida. Dosificar a razón de 1 a 2 mL por cada 5 kg diario, una o dos veces al día por 14 días.

Presentación comercial

Frascos por 55 mL, 110 mL, y 275 mL con tapón dosificador, jeringa graduada y soporte para jeringa.

agrovetmarket
animalhealth

El desarrollo de nuestro portafolio y su registro en diferentes países se basa en la investigación farmacéutica, clínica y científica. Elaboramos formulaciones únicas e innovadoras orientadas a la prevención y tratamiento con el objetivo de satisfacer las necesidades de los veterinarios.

La calidad de nuestros procesos es validada a través de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de SENASA y las certificaciones ISO 9001 e ISO 27001 avaladas por TÜV Rheinland.

Nuestra Misión

Ofrecer productos farmacéuticos y nutricionales veterinarios de clase única; desarrollados de manera creativa e innovadora, con estándares elevados de calidad que nos permitan una proyección internacional y la consolidación local a través del establecimiento formal de alianzas estratégicas.

Nuestra Visión

En el 2030, seremos la empresa líder del mercado de farmacéuticos para uso veterinario en Latinoamérica, no sólo en el nivel de ventas, sino también en innovación, creación de valor y excelencia de nuestros procesos; con productos registrables en cualquier país del mundo y con un componente elevado de responsabilidad social.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9105063844

BPM / GMP



Para más información sobre nuestros productos y su red de distribución, ingresa a **www.petmedica.vet** y a **www.nutrovet.com**

Petmedica® y **Nutrovet®** son marcas registradas por **AGROVET MARKET S.A.**

PRODUCTOS VETERINARIOS DE CLASE ÚNICA

www.agrovetmarket.com / ventas@agrovetmarket.com

/petmedicaAM y /nutrovetAM **(51) 1 2 300 300**

Av. Canadá 3792-3798 / San Luis 15021 Lima – Perú

agrovetmarket
animalhealth

Productos Veterinarios de **Clase Única**
Unique Veterinary Products

BPM / GMP

TÜVRheinland
CERTIFICADO

Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
Válido hasta:
2020-10-20
www.tuv.com
ID 9105063844