



**agrovetermarket**  
animalhealth

## FLUNIMINE® | FLUNIX

### Solución Inyectable

Antiinflamatorio, antipirético, antitóxico y analgésico no esteroide. Específico para el dolor visceral.



### Formulación

Flunixin Meglumina 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

### Indicaciones

Bovinos y rumiantes menores: inflamación aguda asociada con enfermedades del tracto respiratorio, mastitis aguda, paresias posparto, síndrome de la vaca caída, babesiosis y anaplasmosis. Antiendotóxico en neumonías, diarreas, cólicos y mastitis. Equinos: Tratamiento de elección en el cólico equino (antiinflamatorio intestinal y antiendotóxico). Tratamiento de la inflamación aguda en casos de alteraciones musculoesqueléticas. Coadyuvante en enfermedad respiratoria aguda. Porcinos: tratamiento asociado a síndrome de MMA (metritis-mastitis-agalactia), fiebre e inflamación del aparato locomotor. Caninos y felinos: tratamiento de la inflamación y dolor asociados a padecimientos respiratorios, locomotores y cuadros de dolor agudo. En todas las especies: alivio del dolor posquirúrgico y postraumático. En general, cuando esté contraindicado el uso de corticoides.

### Dosis y Administración

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y porcinos: 1 - 2 mL por cada 45 kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 - 5 días; equinos: 1 mL/45 kg p.v., cada 24 horas por 2 días o repetir en casos de cólico a las 2 horas o cuando reaparezcan los síntomas; caninos: 0.1 mL por cada 5 kg de peso vivo; felinos: 0.05 mL por cada 5 kg de peso vivo, tratar cada 24 horas durante 3 - 5 días. Aplicar vía intravenosa o intramuscular.

### Presentación Comercial

Frasco x 100 mL,

### Registro Senasa

SENASA Perú:F.85.01.I.0022.

