

DIFLOVET® OS**1. GENERALIDADES**

- 1.1. **Nombre comercial:** DIFLOVET® OS
- 1.2. **Clase de uso:** Antibiótico Quinolona de Segunda Generación
- 1.3. **Formulación:** Solución Oral

2. COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de **DIFLOVET® OS** contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Difloxacin (Como clorhidrato)	10	g
Excipientes c.s.p.	100	ml

3. INDICACIONES

DIFLOVET® OS es un antibacteriano fluoroquinolónico indicado para el tratamiento de infecciones profundas causadas por una variedad de patógenos Gram positivos (*E. rhusiopathiae*, *Staphylococcus aureus*) y Gram negativos (*M. melagridis*, *M. synoviae*, *H. paragallinarum*, *Chlamydia psitacci*, *Salmonella spp*) en aves de corral, de pelea y ornamentales. Indicado para la Enfermedad Respiratoria Crónica (E.R.C) causada por cepas sensibles de *Escherichia coli* y *Mycoplasma gallisepticum* en pollos y pavos. También está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por *Pasteurella multocida* en pavos.

4. ESPECIES DE DESTINO

Aves.

5. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral a razón de 10 mg de difloxacin/kg de peso vivo, diariamente por 5 días, lo que equivale a administrar de 500 - 1,100 mL/1,000 litros en agua de bebida (dosis recomendada para 10,000 aves, dependiendo del peso del ave y/o a criterio del médico veterinario).

6. RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES

- No existe interacciones.
- No administrar a aves con problemas de artropatías u osteoporosis.
- Debe ser evitado por animales con historial de hipersensibilidad.
- Evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas.

7. PERIODO DE RETIRO

Carne: 24 horas. Huevos: No administrar a gallinas ponedores en producción de huevos para el consumo humano.

DIFLOVET® OS

8. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos. El agua medicada debería ser consumida dentro de las 24 horas.

9. PRESENTACIONES

Frasco x30ml, 50ml, 100ml, 250 ml, 500ml, 1L, 3L, 5L y 20L.