

Tylo-Combsione® OS

1. GENERALIDADES

- 1.1. **Nombre comercial** : Tylo-Combsione® OS
- 1.2. **Clase de uso** : Antibiótico
- 1.3. **Formulación** : Solución Oral
- 1.4. **Descripción** : Potente Combinación Sinérgica Macrólido + Aminoglucósido

2. COMPOSICION

Cada 100 mL de Tylo-Combsione® OS contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Tilosina	15.00	g
Gentamicina	6.00	g
Excipientes c.s.p	100	mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. **Aspecto:** solución traslúcida.
- 3.2. **Color:** amarillo a ámbar.

4. DESCRIPCIÓN

Tylo-Combsione® OS es una asociación antibiótica sinérgica macrólido + aminoglucósido, ideal para el tratamiento y prevención de los procesos causados por microorganismos sensibles a la tilosina y gentamicina. La asociación actúa de manera aditiva.

La tilosina es un macrólido antibiótico de acción bacteriostática principalmente contra bacterias Gram (+) tales como *Campylobacter*, *Micoplasma*, *Pasteurella*, *Estafilococo*, *Streptococo* y *Treponema* spp. La gentamicina pertenece al grupo de aminoglucósidos y posee efecto bactericida principalmente contra bacterias Gram (-) tales como *E. coli*, *Klebsiella*, *Pasteurella* y *Salmonella* spp. La acción bactericida se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas.

Tylo-Combisone® OS

Página 2 de 3

5. INDICACIONES

Indicado en casos de enfermedad respiratoria crónica, neumonías, bronconeumonías, enteritis, gastroenteritis, diarrea blanca, disentería, micoplasmosis, artritis, mastitis, metritis agalactia entre otros.

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves y cerdos. Terneros, corderos, cabritos y tuis.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral en el agua de bebida.

8. DOSIS

- Aves y cerdos: 1 L/2,000 litros de agua; 1 a 2 veces durante 3 - 5 días.
- Terneros, tuis, corderos y cabritos: 2 mL/30 Kg de peso vivo, 1 a 2 veces durante 3 - 5 días.

9. PRECAUCIONES

- Existe la posibilidad de antagonismos entre la gentamicina y el Cloranfenicol.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Este producto es de uso veterinario exclusivamente.
- Agrovvet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

Ninguna

11. PERIODO DE RETIRO

Carne:

Aves: 5 días

Terneros: 21 días

Cerdos: 14 días

Tylo-Combisone® OS

Página 3 de 3

No se recomienda su uso en aves ponedoras.

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños.

13. PRESENTACIÓN

Frascos de 30, 100, 250, 500 mL, 1, 5 y 20 L.