

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial : Porcimec® 2 Px
1.2. Clase de uso : Antiparasitario
1.3. Formulación : Polvo Oral
1.4. Descripción : Antiparasitario de Amplio Espectro, Específico para Cerdos

2. COMPOSICION

Cada 100 g de Porcimec® 2 Px contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Ivermectina	1.00	g
Fenbendazole	10.00	g
Excipientes c.s.p	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo.
3.2. Color: blanco cremoso a ligeramente amarillo.

4. DESCRIPCIÓN

Porcimec® 2 Px es una asociación antiparasitaria de amplio espectro para su administración en el alimento.

5. INDICACIONES

Tratamiento y prevención de infecciones parasitarias internas y externas en cerdo. Antihelmíntico endectocida de acción dual oral de amplio espectro con acción ovicida, larvicida y adulticida. Tratamiento contra infestaciones por artrópodos o nemátodos debidas a: Vermes redondos gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y L4), *Hyostrongylus rubidus* (adultos y L4), *Oesophagostomum* spp. (adultos y L4), *Strongyloides ransomi* (adultos)*. Vermes del pulmón: *Metastrongylus* spp. (adultos). Piojos: *Haematopinus suis*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

Porcimec® 2 Px

Página 2 de 3

*Administrada a cerdas gestantes antes del parto, controla de forma eficaz la transmisión a los lechones de *S. ransomi* a través de la leche.

6. ESPECIES DE DESTINO

Cerdos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el alimento.

8. DOSIS

Administrado en el alimento diariamente durante siete días consecutivos.

Engorde

- Hasta 40 Kg: 200 g / TM alimento
- 40 a 70 Kg: 240 g / TM alimento
- 70 a más: 270 g / TM alimento

Marranas/cerdas

- 400 g / TM alimento x 7 d

9. PRECAUCIONES

- Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina, por lo que recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Este producto es de uso veterinario exclusivamente.
- Al aplicar el producto, evitar el contacto con los ojos, no comer ni fumar, ya que son tóxicas y deberá lavarse las manos después de la aplicación.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

- No administrar por otra vía que no sea la indicada.
- Evitar en animales con historia de hipersensibilidad.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 30 días

12. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto y no almacenar bolsas abiertas.

13. PRESENTACIÓN

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg, 20 kg

Porcimec® 2 Px

1. GENERAL INFORMATION

- 1.1. Tradename : Porcimec® 2 Px
 1.2. Use : Antiparasitic
 1.3. Formulation : Oral powder
 1.4. Description : Broad Spectrum Antiparasitic, Specific for Pigs

2. COMPOSITION

Each 100 g of Porcimec® 2 Px contains:

Component	Quantity	Unit
Ivermectin	1	g
Fenbendazol	10	G
Excipients q.s.ad	100	g

3. PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

- 3.1. Appearance: powder
 3.2. Color: creamy white to slightly yellow

4. DESCRIPTION

Porcimec® 2 Px is a broad spectrum antiparasitic association for its administration in feed.

5. INDICATIONS

Treatment and prevention of internal and external parasitic infections in pigs. Anthelmintic endectocide of dual oral action of broad spectrum with ovicidal, larvicidal and adulticidal action. Treatment against arthropod or nematode infestations due to: Gastrointestinal roundworms: *Ascaris suum* (adults and L4), *Hyostrongylus rubidus* (adults and L4), *Oesophagostomum* spp. (adults and L4), *Strongyloides ransomi* (adults)*. Lungs of the lung: *Metastrongylus* spp. (Adults). Lice: *Haematopinus suis*. Scabies mites: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

*Administered to pregnant sows before birth, effectively controls the transmission to *S. ransomi* piglets through milk.

6. TARGET SPECIES

Swine

7. ADMINISTRATION

Oral route mixed in the feed.

8. DOSAGE

Administered daily in the feed for seven consecutive days.

Fattening

- Up to 40 Kg: 200 g/TN feed
- 40 to 70 Kg: 240 g/TN feed
- 70 Kg and more: 270 g/TN feed

Porcimec® 2 Px

Sows

- 400 g/TN feed x 7 d

9. PRECAUTIONS

- Keep out of reach of children.
- Agrovet Market S.A. is not responsible for the consequences derived from different use (of the product) from the one indicated.

10. CONTRAINDICATIONS

- Do not administer by any other route than indicated.
- Avoid in animals with a history of hypersensitivity

11. WITHDRAWAL PERIOD

Meat: 30 days

12. STORAGE

Store in a cool dry place, protected from light. Store between 8 ° C and 30 ° C. Keep away from children.

13. PRESENTATION

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg, 20 kg.