

## Aureomycin G200 Px

## 1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Aureomycin G200 Px
- 1.2. Clase de uso: antibacteriano
- 1.3. Formulación: polvo

## 2. COMPOSICION

Cada 100 g contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Clortetraciclina	20	g
Excipientes c.s.p.	100	g

## 3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo homogéneo

## 4. DESCRIPCIÓN

Premezcla de Clortetraciclina para la administración oral.

## 5. INDICACIONES

Aves:

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias y digestivas tales como: ERC, micoplasmosis y colibacilosis.

Porcinos:

Para el tratamiento de rinitis atrófica, leptospirosis y neumonías causadas por neumococos.

Bovinos:

Se recomienda para el tratamiento de enfermedades causadas por *Haemophilus* spp, *Actinobacillus* spp, *Pasteurella* spp, *Anaplasma* spp y microorganismos asociados a la pododermatitis.

## 6. ESPECIES DE DESTINO

Aves, Porcinos y Pre-rumiantes

## 7. ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral mezclado en el alimento a las siguientes concentraciones:

Aves y Cerdos: 2 Kg por tonelada de pienso;

Pre-rumiantes: 2 – 3 Kg de por tonelada de pienso.

## Aureomycin G200 Px

Página 2 de 2

Aureomycin G200 Px deberá mezclarse con al menos el 5% de alimento a dosificar y luego de ser incorporado a la totalidad del mismo. Administrar el alimento medicado como única ración durante los periodos recomendados.

### 8. PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.
- La absorción de la clortetraciclina queda disminuida si se da conjuntamente con alimentos ricos en cationes divalentes y trivalentes, sobre todo calcio, hierro, magnesio y cobre.

### 9. CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.
- No administrar a hembras gestantes o en lactación.
- No administrar en rumiantes con rumen funcional.

### 10. PERIODO DE RETIRO

Becerras, ovinos y cabritos y cerdos: 0 días.

Pollos: 1 día.

No administrar en aves productoras de huevo ni en vacas lecheras.

### 11. ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente entre 15°C a 30°C en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños

### 12. PRESENTACIÓN

Sobres de 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500 g, bolsa de 1, 5, 10, 15, 20 y 25Kg