

OPTIFLOR® OS**1. GENERALIDADES****1.1. Nombre comercial:** OPTIFLOR® OS**1.2. Clase de uso:** Antibiótico**1.3. Formulación:** Solución Oral**2. COMPOSICIÓN**Cada 100 ml de **OPTIFLOR® OS** contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Florfenicol	10	g
Excipientes c.s.p.	100	ml

3. DESCRIPCIÓN

El florfenicol es un antibiótico de amplio espectro, desarrollado a partir del tianfenicol, como una alternativa a la resistencia bacteriana y sin efectos secundarios en comparación con el cloranfenicol. Tiene un espectro más amplio que el cloranfenicol y es cerca de 100 veces más potente. Actúa contra microorganismos gram-positivos y gramnegativos, e incluso muestra un espectro superior a su análogo, tianfenicol.

4. INDICACIONES

OPTIFLOR® OS está indicado para el Tratamiento preventivo y terapéutico de infecciones debido a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Actinobacillus pleuroneumoniae* y *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Clostridium spp.*, *Ornitobacterium rhinotracheale*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Lawsonia intracellularis* y *Salmonella choleraesuis* entre otras bacterias susceptibles al florfenicol.

Indicaciones específicas incluyen:

Cerdos: Síndrome respiratorio porcino, ileítis, pleuroneumonía, rinitis atrófica e infecciones gastrointestinales causadas por gérmenes susceptibles;

Aves: colibacilosis, pasteurelosis e infecciones respiratorias bacterianas -saculitis, colisepticemia entre otras- y gastrointestinales causadas por gérmenes susceptibles.

5. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos y pavos; de engorde y reemplazo) y cerdos.

6. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 20 mg/Kg por 3-5 días, en la práctica 1L/1000 L agua (100 mg/L;).**Porcinos:** 10-20 mg/Kg por 5 días, en la práctica 1L-2L/1000 L agua (100-200 mg/L).*Notas a la Administración:**1. Las dosis expresadas son referenciales.*

2. Como el consumo de agua puede variar, se debería determinar el peso vivo con la mayor precisión posible y la dosis debería ser reajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

3. Agite el envase antes de utilizarlo, luego preparare una primo dilución en aproximadamente 10 litros de agua para luego incorporar a la totalidad del agua de bebida.

4. El agua que contiene Optiflor® OS deberá administrarse como única fuente de agua durante los periodos recomendados y ser renovada diariamente.

5. Consulte a su veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

7. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

- No usar en aves ponedoras.
- No usar en verracos destinados a la cría, ni en animales que producen huevos o leche para consumo humano.
- No administrar en casos de hipersensibilidad al florfenicol.
- No se recomienda su uso durante la preñez ni lactancia.
- Durante el tratamiento, puede producirse una disminución en el consumo de alimentos y agua, un reblandecimiento transitorio de las heces o la diarrea y/o protrusión anal transitoria.
- Los animales tratados se recuperan rápida y completamente al finalizar el tratamiento. Agitar bien antes de usar.
- Debe ser diluido antes de administrar a los animales.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

8. PERIODO DE RETIRO

Cerdos: 16 días. Aves: 07 días. No debe utilizarse en animales que producen huevos ni leche para consumo humano.

9. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 – 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

10. PRESENTACIONES

Frasco x30ml, 50ml, 100ml, 250 ml, 500ml, 1L, 5L, 10L, 20L.