

Nueva Línea de **Suspensiones Intramamarias**

para el **tratamiento de la mastitis**

Presentación de 48 Jeringas



Listas para su uso





Lactación

Cefquinox® LC

Cefquinoma (como sulfato) 75mg,
Excipientes c.s.p. 8g.

El "profesional" espectro in vivo
comprobado contra las cepas
importantes productoras de mastitis⁽¹⁾



Cefalosporina de Cuarta Generación.

Aplicación: Cada 12 horas
Periodo de retiro en leche: 96 horas

Clox-A-Lac®

Ampicilina (como trihidrato) 75 mg, Cloxacilina
(como sal sódica) 200 mg, Excipientes c.s.p. 5 g.

Asociación para lactación al
mejor precio.



Sinergia Antibiótica de Amplio espectro.

Aplicación: Cada 12 horas
Periodo de retiro en leche: 60 horas

Kanacef® LC

Cefalexina (como monohidrato) 200 mg,
Kanamicina sulfato 100 000 UI,
Excipientes c.s.p. 10 g.

Potente asociación sinérgica al precio
adecuado



Asociación Betalactámica-aminoglucósido
de Amplio Espectro.

Aplicación: Cada 24 horas
Periodo de retiro en leche: 108 horas

Pen Tetra Strep® LC

Penicilina G Procaínica 100,000 UI, Estreptomicina
Sulfato 100 mg, Neomicina Sulfato 100 mg,
Prednisolona 10 mg, Excipientes c.s.p. 5 g.

El poder del Pen Strep más
antinflamatorio ahora en una jeringa
antimastítica



Triple Asociación Sinérgica
antibiótica-antinflamatoria de
Amplio Espectro.

Aplicación: Cada 24 horas
Periodo de retiro en leche: 108 horas

Para obtener leche de buena
calidad es fundamental
mantener una ubre sana,
lo que representa
**MAYOR PRODUCCIÓN
Y RENTABILIDAD**



Secado

Cefquinox® DC

Cefquinoma (como sulfato) 150mg,
Excipientes c.s.p. 3g.

El "profesional" espectro in vivo
comprobado contra las cepas
importantes productoras de mastitis⁽¹⁾



Cefalosporina de Cuarta Generación.

Aplicación: Al terminar el periodo de lactancia.

Clox-A-Dry®

Ampicilina (como trihidrato) 250 mg, Cloxacilina
(como benzatínica) 500 mg, Excipientes c.s.p 4.5 g.

Asociación para secado al mejor
precio.



Sinergia Antibiótica de Amplio Espectro.

Aplicación: Al terminar el periodo de lactancia.

Recordemos

La mastitis bovina es una de las principales enfermedades infecciosas que afecta la ubre de los bovinos, provocando inflamación en la glándula mamaria y reduciendo tanto la calidad como la cantidad de la leche. Por ello, detectarla y tratarla a tiempo es crucial para mejorar la productividad y aumentar los ingresos, garantizando un buen rendimiento en el sector ganadero.

1) Delgado J. 2022. Informe Técnico-Aplicación de chisguetes intramamarios y oculares. ISA 010-22
En la evaluación in vitro, las cepas de *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae* y *Staphylococcus aureus*
fueron sensibles al principio activo de Cefquinox® LC y Cefquinox® DC.

⚠ Factores de riesgo

- ✓ Equipo contaminado (jeringas, equipo de ordeño, recipientes de sellador, etc.)
- ✓ Ambientales (suelo, agua y cama del corral sucios)
- ✓ Manejo (inadecuada higiene del personal que manipula las ubres, sobreordeño)
- ✓ Estrés (por hacinamiento, transporte, cambios de dieta)



LOS ALIADOS DE SIEMPRE

Cefa-Milk® Forte

Por cada 1ml: Cefalexina monohidrato, (Base) 20 mg, Gentamicina sulfato, (Base) 10 mg, dexametasona 21 fosfato 0,075 mg, vitamina A 1 000 UI

Todo lo que necesitas para el tratamiento de la mastitis



Potente acción antibiótica adicionada con vitamina A como regenerador epitelial de la glándula mamaria y dexametasona para reducir el proceso inflamatorio.

Aplicación: Cada 12 - 24 horas durante dos días o hasta recuperación completa

 Vacas en lactación

Cefa-Sec®

Por cada 1ml: Cefalexina monohidrato 20 mg, Neomicina sulfato 34 mg, Cloxacilina benzatínica 50 mg, Vitamina A 1000 UI

Triple acción antibacteriana para el control y prevención de la mastitis



Infusión antibiótica para vacas en seca asociada con vitamina A como regenerador epitelial de la glándula mamaria.

Aplicación: Luego del último ordeño del período de lactancia.

 Vacas en seca

Presentación de 48 Jeringas

