

Ectonil® Pour On

Solución externa
Garrapaticida e Insecticida

agrovvetmarket s.a.

FÓRMULA

Fipronil 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES

Tratamiento y control de la mosca de los cuernos, garrapatas, nuca (tupe o ura), piojos masticadores, chupadores y miasis (gusaneras).

ECTONIL® Pour On es un insecticida cuyo ingrediente activo es el fipronil (1% p/v), un derivado de los fenilpirazoles. Por ser un nuevo compuesto no relacionado con los ya existentes controla parásitos externos resistentes a otras moléculas como piretroides, organofosforados y amidinas.

Por su formulación (de bajo volumen y lista para su uso) al ser aplicado en el dorso de los animales se distribuye perfectamente por toda la piel y el pelo de los animales por tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones.

BENEFICIOS

Alta eficacia contra cepas resistentes a piretroides y fosforados de la mosca de los cuernos y garrapatas. Facilidad de aplicación. Más control por más tiempo. Menos estrés por menos movimientos y baños. Más ganancia de peso. Seguridad para el animal y para la persona que lo aplica.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento y control de los siguientes parásitos externos de los bovinos: garrapatas (*Boophilus microplus*), mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), piojos masticadores (*Damalinia bovis*), piojos chupadores (*Linognathus vituli*) y miasis nodular (*Dermatobia hominis*); y otros parásitos externos que afectan a ovinos, camélidos, equinos.

DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación epicutánea.

Bovinos, ovinos, camélidos y equinos: La dosis recomendada es de 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por kg de peso vivo.

Retirar la tapa, presionar levemente hasta que el exclusivo sistema Pourmatic® del frasco permita llenar la dosis requerida en la cámara superior. Aplicar topicalmente a lo largo de la línea dorsal que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola.

Para resultados óptimos **ECTONIL® Pour On** debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa planificado de control de parásitos externos.

El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del centro de crianza. Consulte a su Veterinario para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

PERÍODO DE RETIRO

Carne: 100 días. No usar en animales productores de leche para consumo humano. No usar en vaquillonas destinadas a la producción láctea durante los tres meses previos al parto.

RESTRICCIONES DE USO

Sólo para uso externo. NO APLICAR POR OTRA VÍA.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y PRECAUCIONES

- No presenta efectos secundarios ni incompatibilidades.
- Aplicar el producto al animal en un espacio ventilado.
- No utilizar en animales enfermos o convalecientes.
- No aplicar en zonas de la piel con heridas.

PRECAUCIONES DE USO

No reutilizar el envase vacío. Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc. Lavar las manos y piel expuesta luego del uso. De existir contacto directo con la piel, lavar con abundante agua y jabón. De existirlo en los ojos, hacerlo con abundante agua durante 15 minutos. Si se ingiriese, beber grandes cantidades de agua, acudiendo de inmediato al médico con esta etiqueta. Si existiese intoxicación, llevar de inmediato a emergencia y mostrar esta etiqueta al médico. No existe antídoto específico. **Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.**

MEDIDAS ADICIONALES

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, lejos de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Almacenar entre 8°C y 30°C. No contaminar agua, comida, alimentos con el producto o el envase lleno o vacío. Almacenar en su envase original. Envuelva el frasco en varias hojas de papel y arrójealo a la basura, nunca al agua pues afecta animales acuáticos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco tipo gotero x 30 mL, frasco x 120 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.

Venta con receta médica

Reg. SENASA Perú: F.07.03.N.0281;
Bolivia: Reg. SENASAG N° 006006/14; Costa Rica: Reg. MAG PE10-43-06-3405; Reg. Ecuador: 3B1-3-9149-AGROCALIDAD; Reg. Guatemala: PE634-43-02-5227; Reg. Honduras: IP-528; Reg. Nicaragua: 10603; Reg. Panamá: RF-3332-15; Reg. Rep. Dominicana: 5634; Reg. Santa Lucía: 2015/008; Reg. Venezuela: MAT-SASA-P.I.11.393

Ectonil® es marca registrada de:



Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú
Tel.: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovvetmarket.com - Web: www.agrovvetmarket.com

Importado y distribuido por Grupo Grandes S.A. Av. Galo Plaza Lasso N° 53-127 y Humberto Marín, Quito-Ecuador

Ectonil® Pour On

External Use
Tick killer and Insecticide

agrovvetmarket s.a

FORMULATION

Fipronil..... 1 g
Excipients..... q.s.ad..... 100 mL

DESCRIPTION

Treatment and control of horn fly, ticks, Dermatobia (human bot fly), chewing and sucking louse, and myiasis.

Ectonil® Pour On is an insecticide which active ingredient is fipronil (1% m/v), a member of a new class of chemicals known as phenylpyrazole, that controls external parasites resistant to pyrethroids, organophosphates and amidines.

Due to its formulation (low volume and ready to use) when is applied on animal's dorsal line, it gets a distribution all over the skin and hair of animals because it has an affinity for sebaceous glands and its secretions.

BENEFITS

High efficacy against ticks and horn fly strains resistant to pyrethroids and organophosphates. Easy application. Major control for longer time. Less stress due to less movements and baths. More weight gain. Safety for animal and person who handles it.

INDICATIONS

Treatment and control of the following external parasites of cattle, sheep, camelids, horses, guinea pigs: Ticks (*Boophilus microplus*), horn fly (*Haematobia irritans*), chewing lice (*Damalinea bovis*), sucking lice (*Linognathus vituli*) and nodular myiasis (*Dermatobia hominis*); flies (*Melophagus ovinus*) and poultry: fleas (*Echidnophaga gallinacea*), louses (*Menopon gallinae*, *Lipeurus caponis*) and mites (principally *Dermanyssus gallinae* or red mite).

DOSAGE AND APPLICATION METHOD

Epicutaneous application.

Cattle, sheep, camelids and horses: The recommended dose is 1 mL/10 kg of body weight, equivalent to 1 mg of fipronil/kg b.w.

Guinea pigs and poultry: The recommended dose is of 0.1 mL/kg b.w., equivalent to 1 mg of fipronil/kg b.w.; which in the practice is equivalent to two drops per each kg b.w., applied on the back of the animal.

Remove the cap, press slightly until the exclusive bottle system Pourmatic® allows to fill the required dosage in the superior camera. Apply along the dorsal line in a narrow strip extending along the top of the back from the withers to the tailhead.

For optimal results, **Ectonil® Pour On** must be applied to all the animals in the herd on an external parasitic control program.

The treatment interval could be at least every two months, it will depend on the severity of the infestation, weather and management conditions in the herd. Consult your veterinarian to determine the better moment for the treatment.

WITHDRAWAL PERIOD

Meat: 100 days. Do not use in lactating cattle producing milk for human consumption. Do not use in pregnant cows or heifers, which are intended to produce milk for human consumption, within 3 months of expected parturition.

USE RESTRICTIONS

External use only. Do not apply by another route of administration.

CONTRAINDICATIONS, NON DESIRED EFFECTS AND PRECAUTIONS

- It does not present secondary effects or incompatibilities.
- Apply the product to the animal in a ventilated area.
- Do not use in sick or convalescent animals.
- Keep in a dry, cool place, protected from light. Storage among 8° to 30° C.
- Do not apply the product to wounded skin.

USE PRECAUTIONS

Do not reuse the empty container. Avoid contaminating leaks such as rivers, streams, etc. Wash the exposed hands and skin after its use. If there is a direct contact with the skin, wash with plenty of water and soap. If there is a contact with the eyes, do it with plenty of water for 15 minutes. If ingested, drink large amounts of water, going immediately to the doctor with this leaflet. If there is a case of intoxication, take the person immediately to emergency and show this leaflet to the doctor. There is not a specific antidote. **Keep out of reach of children and domestic animals.**

ADDITIONAL MEASURES

Keep in a dry, cool place, protected from the sun light, away of food, hygiene products and drugs. Store among 8° to 30° C. Do not contaminate water or food with the product or the empty or filled container. Store in its original container. Wrap the container in several sheets of paper and throw it to the garbage, never to the water because it affects aquatic animals.

COMMERCIAL PRESENTATION

Dropper bottle of 30 mL, bottle of 120 mL, 500 mL, 1 L, gallon bottle of 3.9 L and 5 L.

Reg. SENASA Peru: F.07.03.N.0281;
Reg. Costa Rica: Reg. MAG PE10-43-06-3405;
Reg. Ecuador: 3B1-3-9149-AGROCALIDAD;
Reg. Guatemala: PE208-43-02-1220;
Reg. Honduras: IP-528; Reg. Nicaragua: 6889;
Reg. Panama: RF-3332-05; Reg. Dominican Rep.: 5634;
Reg. Venezuela: MAT-SASA-P.I.11.393

Ectonil® is a registered trademark of



agrovvetmarket
animalhealth

Av. Canada 3792-3798, San Luis, Lima 30 - Peru
Tel.: (511) 2 300 300
Email: ventas@agrovvetmarket.com - Web: www.agrovvetmarket.com