

1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial : Cyromix® 100 Px
1.2. Clase de uso : Antiparasitario
1.3. Formulación : Polvo Oral
1.4. Descripción : Larvicida Regulador de Crecimiento para Medicación Oral

2. COMPOSICION

Cada 100 g de Cyromix® 100 Px contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Ciromazina	10.00	g
Excipientes c.s.p	100	g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: polvo.
3.2. Color: Blanco a blanquecino

4. DESCRIPCIÓN

Cyromix® 100 Px es una premezcla medicamentosa que contiene un regulador sintético de crecimiento de insectos que actúa inhibiendo la muda y la pupación.

5. INDICACIONES

Aditivo alimenticio para el control de larvas de las moscas (Mosca del establo: *Stomoxys calcitrans*, mosca del cuerno, *Haematobia irritans*, pequeña mosca domestica *Fannia canicularis*, mosca del estiércol de los pollos *Fannia pusio*, mosca doméstica, *Musca domestica*, mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*) y pulgas en aves (Pulga de la gallina *Echidnophaga gallinacea*, pulga del hombre *Pulex irritans*).

6. ESPECIES DE DESTINO

Aves.

7. ADMINISTRACIÓN

Oral en el alimento. Se adiciona en el alimento balanceado de gallinas en producción durante cuatro a seis semanas continuas, seguido de un periodo de descanso que puede durar de cuatro a seis semanas.

8. DOSIS

Dosis en aves:

500 g por tonelada de alimento por dos períodos de 4 a 6 Semanas, con un intervalo de 4 a 6 semanas sin tratamiento. Para reducir de inmediato la población de mosca, debe aplicarse Cyromix® 100 Px y un adulticida (como No-Fly).

Dosis en materia orgánica:

1000 g por tonelada de materia a tratar. Después de esparcido el producto se recomienda revolver la materia ya tratada.

9. PRECAUCIONES

- Evite contaminar las fuentes de agua con los residuos del lavado o limpieza.
- Evitar al máximo la entrada de agua sobre la gallinaza y la cama para no diluir el producto.
- Evitar el contacto con la piel u ojos o su inhalación. En caso de producirse, lavar con abundante agua.
- No comer ni fumar durante la manipulación del producto o su aplicación.
- Usar ropas adecuadas, guantes, protección ocular y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

10. CONTRAINDICACIONES

- No agregar el producto directo al alimento; mezclar de manera gradual.

11. PERIODO DE RETIRO

Carne: 3 días

12. ALMACENAMIENTO

Cyromix® 100 Px

Página 3 de 3

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del alcance de los niños. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez abierto y no almacenar bolsas abiertas.

13. PRESENTACIÓN

15 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Cyromix® 100 Px

1. CHARACTERISTICS

- 1.1. Commercial name: Cyromix® 100 Px
- 1.2. Use Class: Antibiotic.
- 1.3. Formulation: Oral Powder
- 1.4. Description: Growth Regulator Larvicide for Oral Medication

2. COMPOSITION

Each 100 g of Cyromix® 100 Px contains:

Component	Quantity	Unit
Ciromazine	10	g
Excipients q.s.ad.	100	g

3. PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

- 3.1. Aspect: powder
- 3.2. Color: white to whitish

4. DESCRIPTION

Cyromix® 100 Px is a drug premix containing a synthetic insect growth regulator that acts by inhibiting shedding and pupation.

5. INDICATIONS

Feed additive for the control of larvae of flies (Stable fly: *Stomoxys calcitrans*, Horn fly, *Haematobia irritans*, small housefly *Fannia canicularis*, fly from chicken manure *Fannia canicularis*, house fly, *Musca domestica*, fruit fly *Drosophila melanogaster*) and fleas in poultry (Flea of the hen *Echidnophaga gallinacea*, flea of the man *Pulex irritans*).

6. TARGET SPECIES

Poultry

7. ADMINISTRATION

Oral in the feed. It is added to the balanced feed of chickens in production for four to six continuous weeks, followed by a rest period that can last four to six weeks

8. DOSAGE

Dosage in poultry:

500 g per ton of feed for two periods of 4 to 6 weeks, with an interval of 4 to 6 weeks without treatment. To reduce the fly population immediately, Cyromix® 100 Px and an adulticide (such as No-Fly) should be applied.

Dosage in organic matter:

1000 g per ton of material to be treated. After spreading the product it is recommended to stir the already treated material.

9. PRECAUTIONS

- Avoid contaminating water sources with washing or cleaning residues.
- Avoid the entrance of water to the manure and the bed so as not to dilute the product.

Cyromix® 100 Px

Page 2 of 2

- Avoid contact with skin or eyes or inhalation. If it occurs, wash with plenty of water.
- Do not eat or smoke during the handling of the product or its application.
- Wear suitable clothing, gloves, eye and respiratory protection.
- Keep out of the reach of children.
- Agroveter Market S.A. is not responsible for the consequences derived from different use (of the product) from the one indicated.

10. CONTRAINDICATIONS

- Do not add the product directly to the feed; mix gradually.

11. WITHDRAWAL PERIOD

Meat: 3 days

12. STORAGE

Store in a cool, dry place protected from light between 15 and 30 ° C in the original container, out of the reach of children. It is recommended to use all the content once opened and not to store open bags.

13. PRESENTATION

15 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg