

PLEUROTIL® 250 OS**1. GENERALIDADES**

- 1.1. **Nombre comercial:** PLEUROTIL® 250 OS
1.2. **Clase de uso:** Antibiótico Macrólido de Afinidad Pulmonar Selectiva
1.3. **Formulación:** Solución Oral

2. COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de PLEUROTIL® 250 OS contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Tilmicosina	25	g
Excipientes c.s.p.	100	ml

3. DESCRIPCIÓN

Pleurotil® 250 OS es un antibiótico macrólido de muy buena actividad ante microorganismos gram positivos y actividad significativa contra ciertas bacterias gram negativas y micoplasmas. Su alta liposolubilidad le facilita un pasaje rápido por las membranas celulares con una consecuente alta concentración en tejidos, principalmente pulmones y sacos aéreos. Alcanza niveles terapéuticos en ellos dentro de las primeras 6 horas y se mantienen por al menos 48 horas después del tratamiento. Los procesos infecciosos e inflamatorios aumentan su penetración titular, actuando además de forma sinérgica con el sistema inmunitario del animal, potenciando la acción bacteriófaga de los fagocitos (monocitos, macrófagos y neutrófilos de sangre y pulmón) y de algunas células epiteliales.

4. INDICACIONES

Pollos y pavos: infecciones respiratorias causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida* y otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

Porcinos: tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Mycoplasma spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Kliebsella spp.*, *Haemophilus parasuis*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Actinobacillus Pleuropneumoniae* y *Streptococcus spp.*, entre otros microorganismos susceptibles a la tilmicosina.

Terneros: síndrome respiratorio bovino asociado a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma spp.* Tratamiento de necrobacilosis interdigital.

5. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos, pavos), cerdos y terneros.

6. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 300 mL/1,000 L, durante 3 días.

Porcinos: 800 mL/1000 L por 5 días.

Terneros: 1 mL/20 Kg de peso vivo por 3 – 5 días.

PLEUROTIL® 250 OS

Preparación del producto para su correcto uso: Agitar el envase antes de utilizarlo, luego preparar una primo dilución en un pequeño recipiente de agua (aproximadamente 10 litros), así se logrará una buena disolución del medicamento y luego se lleva esta preparación al volumen final.

7. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

- No usar en aves ponedoras.
- No permitir que los caballos y otros equinos tengan acceso al agua de bebida que contenga tilmicosina.
- No usar en caso de hipersensibilidad a la tilmicosina o a algún excipiente.
- Agitar bien antes de usar.
- Debe ser diluido antes de administrar a los animales.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

8. PERIODO DE RETIRO

Cerdos: 14 días. Pollos: 12 días. Pavos: 19 días. Terneros: 42 días. No debe usarse en aves ponedoras de huevos. No usar en animales lactantes.

9. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 – 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

10. PRESENTACIONES

Frasco x10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250 ml, 500ml y 1L.