

Profelis®

DROP ON

Ectoparasiticida de Efecto Ultra Rápido

Antiparasitario Externo de Efecto Integral específico para Gatos

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

Cada 1 mL contiene:

Dinotefuran	110 mg
Fipronil	45 mg
Piriproxifen.....	15 mg
Excipientesc.s.p.	1 mL

GENERALIDADES

Profelis® Drop On es el primer parasiticida tópico para pulgas, garrapatas -y otros ectoparásitos- de acción ultra rápida, diseñado por veterinarios específicamente para gatos.

Profelis® Drop On protege a los gatos no sólo de los parásitos sino también de las enfermedades transmitidas por los mismos:

1. Por garrapatas (babesiosis, ehrlichiosis, anaplasmosis, enfermedad de Lyme, cuyaurozoonosis, haemobartonelosis, hepatozoonosis, meningoencefalitis de garrapata, parálisis por garrapatas).
2. Por pulgas (rickettsiosis, bartonelosis, diplidirosis).

Profelis® Drop On es una asociación novedosa correspondiente a un antiparasitario externo integral en solución tópica, que contiene 3 componentes en su formulación: dinotefuran, fipronil y piriproxifen. Se caracteriza por:

- Acción inmediata, contra pulgas inicia su actividad en tan sólo 35 segundos luego de aplicado y elimina el 97% de las mismas en sólo 3 horas.
- Gran poder de volteo (knockdown).
- No es necesario que el parásito pique (muerda) al felino para que Profelis® Drop On actúe.
- No sólo elimina las pulgas y garrapatas por contacto sino que además rompe el ciclo de vida de ambos parásitos.
- Posee actividad contra los ectoparásitos más importantes de los gatos.

Su formulación exclusiva, sinergizante, le otorga los siguientes efectos:

1. Triple acción contra las pulgas: dos principios activos pulgicidas contra formas adultas de acción inmediata y uno con efecto residual ambiental contra sus estadios inmaduros.
2. Doble acción piójicida.
3. Efecto adicional acaricida.
4. Efecto garrapaticida.

El dinotefuran es un insecticida neonicotínoide de tercera generación, se une pobemente al receptor de acetilcolina de insectos, por lo que sugiere un diferente y novedoso mecanismo de acción. Frente al imidacloprid, (neonicotínoide de primera generación), presenta las siguientes ventajas: es una nueva molécula que no tiene resistencia inicial nula) posee mayor efectividad y poder de repelencia, superior fotoestabilidad y seguridad.

El fipronil actúa sobre varios puntos del sistema nervioso de los parásitos, provocando una muerte por hiperexcitación nerviosa; el piriproxifen por su lado, impide el desarrollo de los estadios inmaduros de las pulgas, expandiendo su actividad para incluir huevos, larvas y pupas y con ello permite un control ambiental.

INDICACIONES DE USO

Profelis® Drop On está indicado para la prevención y tratamiento de la infestación por pulgas, garrapatas, ácaros y piojos en gatos. Colabora en la prevención y/o tratamiento de todas las enfermedades y zoonosis que estos producen y/o transmiten.

1. **Pulgas:** Acción adulticida en animales infestados y prevención de nuevas infestaciones durante por lo menos un mes. Eficaz sobre *Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*. Interfiere en la eclosión de huevos y en la inhibición de la transformación de pulgas inmaduras en adultos, evitando la reproducción de las pulgas durante por lo menos sesenta días. Prevención y tratamiento (junto a otras acciones) de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).

2. **Garrapatas:** Acción sobre todas sus estapas de vida: adulticida, larvicia. Actúa sobre *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis* y *Dermacentor reticulatus*.

3. **Piojos:** Acción piójicida (adulticida y larvicia): *Trichodectes canis*.

4. **Acaricida:** El fipronil ha demostrado tener acción contra *Otodectes cynotis*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Sólo para uso externo. 1 pipeta de 1 mL por animal, sin importar peso o tamaño. El producto puede utilizarse en gatitos a partir de las 8 semanas de edad y con un peso mínimo de 750 g, no se recomienda en gatos menores a este peso.

Forma de administración

El gato debe estar parado en una posición confortable. Apartar el pelo del lomo hasta que la piel sea visible (no aplicar el contenido sobre el pelo), descargar el contenido en un punto, sobre el cuello (cruz) del animal, sobre la piel seca. Evitar el contacto con la boca y ojos del animal, evitar el lamido del animal y administrar hasta que la pipeta se encuentre vacía. Se incluye una descripción gráfica al final de este documento.

Intervalo entre dosis

Se recomienda una aplicación mensual, aunque cuando se use para el control de pulgas y dependiendo del grado de infestación, puede controlar estos parásitos hasta por 60 días. Con la finalidad de no olvidar la siguiente dosis, se incluye adhesivos recordatorios para ser pegados en el calendario.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- Evitar que el animal se lame durante la aplicación.
- Descartar la pipeta inmediatamente luego de su uso.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Consulte al Médico Veterinario
- Almacenar entre 15°C y 30°C. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- No permitir que los gatos tratados entren en contacto con aguas superficiales durante 48 horas posteriores a su aplicación para evitar efectos adversos sobre organismos acuáticos.
- No permitir contacto directo con el gato tratado -sobre todo de niños- durante al menos cuatro horas tras su administración. Esperar a que la zona de aplicación esté seca antes de permitir que el gato entre en contacto con muebles o enseres.
- No mezclar ni aplicar conjuntamente con otro medicamento en el mismo sitio.
- Profelis® Drop On mantiene su eficacia, aunque el gato tratado se moje o se sumerja en agua. Sin embargo, no se recomienda bañar al animal con champú o sumergirlo en las 48 horas siguientes a la aplicación. En caso de baños muy frecuentes con champú, la duración de la eficacia del medicamento puede verse reducida.

SEGURIDAD EN LOS ANIMALES

- Solo para uso en gatos. No usar en otras especies.
- El producto puede utilizarse en gatitos a partir de las 8 semanas de edad y con un peso mínimo de 750 g, no se recomienda en gatos menores a este peso.
- Posee un excelente margen de seguridad, sin embargo, se recomienda utilizar de acuerdo a lo indicado.
- Estudios realizados con los componentes activos no han demostrado efectos teratogénicos ni embriotóxicos. Sin embargo, el producto solo debería utilizarse en hembras preñadas o lactantes por recomendación de un veterinario.
- En casos aislados e individuales, en animales sensibles a alguno de los componentes, se puede observar enrojecimiento del área, prurito u otros signos de molestia en las zonas de aplicación que normalmente desaparecen a las 24 horas siguientes. En muy raras ocasiones se han observado efectos adversos gastrointestinales como vómito y diarrea.
- El producto es muy seguro, sin embargo, animales muy jóvenes, geriátricos, debilitados o en medicación concomitante podrían ser más susceptibles a signos de intoxicación a dosis mayores a las indicadas. El tratamiento es sintomático, bañando al animal con agua y detergente hasta disminuir la concentración del producto sobre la piel del animal.
- En caso de ingestión accidental de la dosis recomendada, pueden producirse vómitos, salivación y diarrea, los cuales deberían desaparecer sin tratamiento.

SEGURIDAD EN LAS PERSONAS

- Puede ser fatal si se ingiere.
- No beber, fumar o comer durante su aplicación.
- Lavar las manos antes y después de la aplicación.
- Evitar contacto con ojos y mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- No ingerir ni almacenar con alimentos.

PRESENTACION COMERCIAL

Caja conteniendo 5 pipetas plásticas con tapa protectora reutilizable x 1 mL.

M.V. Resp. Emp. Titular: Umberto Calderón O. CMVP 2944
Reg. SENASA Perú: F.87.37.N.0264; Bolivia: SENASAG Reg. PUV- F N° 008844/18;
Reg. Nicaragua: 11785.

Profelis® y logotipo son marcas registradas de Agrovet Market S.A



Av. Canadá 3792-3798, San Luis, Lima 15021 - Perú


Tel.: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Importado y distribuido en Ecuador por Grupo Grandes S.A.
Calle N74C y Calle E4. Quito.

Fabricado en el Perú por Farmex S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Dpto. 07 San Isidro. Lima-Perú.
VENTA LIBRE

Profelis® ¿Cómo aplicar?



Profelis®

DROP ON

Ultra Fast Effect Ectoparasiticide

External Antiparasitic with Integral Effect Specific for Cats

agrovetmarket s.a.

FORMULATION

Each 1 mL contains:	
Dinotefuran	110 mg
Fipronil	45 mg
Pyriproxyfen.....	15 mg
Excipients ...q.s.ad.....	1 mL

GENERALITIES

Profelis® Drop On is the first topical parasiticide for fleas, ticks - and other ectoparasites - of ultra fast action, designed by veterinarians specifically for cats.

Profelis® Drop On protects cats not only from parasites but also from the diseases transmitted by them:

1. For ticks (babesiosis, ehrlichiosis, anaplasmosis, Lyme disease, cytauxzoonosis, haemobartonellosis, hepatozoonosis, tick meningoencephalitis, tick paralysis)
2. Fleas (ricketsiosis, bartonellosis, dipidiosis).

Profelis® Drop On is a novel association corresponding to an integral external antiparasitic in topical solution, which contains 3 components in its formulation: dinotefuran, fipronil and pyriproxyfen. It is characterized by:

- Immediate action against fleas starts its activity in only 35 seconds after being applied and eliminates 97% of them in only 3 hours.
- Great knock down power.
- It is not necessary that the parasite bites the cat so that Profelis® Drop On acts.
- Not only eliminates fleas and ticks by contact but also breaks the life cycle of both parasites.
- It has activity against the most important ectoparasites of cats.

Its exclusive formulation, synergizing, gives it the following effects:

1. Triple action against fleas: two main actives that are flea killers against adult forms of immediate action and one with residual environmental effect against their immature stages.
2. Double lice action.
3. Miticide additional effect.
4. Tick killer effect.

Dinotefuran is a third-generation neonicotinoid insecticide that binds poorly to the insect acetylcholine receptor, suggesting a different and novel mechanism of action. Compared with imidacloprid, (first-generation neonicotinoid), it has the following advantages: it is a new molecule for use in cats (equivalent to zero initial resistance), it has greater effectiveness and repellent power, superior photostability and safety.

Fipronil acts on several points of the nervous system of the parasites, causing a death by nervous hyperexcitation; pyriproxyfen, on the other hand, prevents the development of immature stages of fleas, expanding its activity to include eggs, larvae and pupae.

INDICATIONS

Profelis® Drop On is indicated for the prevention and treatment of infestation by fleas, ticks, mites and lice in cats. It collaborates in the prevention and/or treatment of all the diseases and zoonoses that these produces and/or transmit.

1. **Fleas:** Adulcide action in infested animals and prevention of new infestations for at least one month. Effective on *Ctenocephalides felis* and *Ctenocephalides canis*. It interferes with the hatching of eggs and the inhibition of the transformation of immature fleas into adults, avoiding the reproduction of fleas for at least 60 days. Prevention and treatment (along with other actions) of allergic dermatitis to flea bite (DAPP).
2. **Ticks:** Action on all their stages of life: adulcide, larvicide. It acts on *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis* and *Dermacentor reticulatus*.
3. **Lice:** Lice action (adulcide and larvicide): *Trichodectes canis*.
4. **Acaricide:** Fipronil has been shown to have an action against *Otodectes cynotis*.

DOSE AND ADMINISTRATION ROUTE

Only for external use. 1 pipette of 1 mL per animal, regardless of weight or size. The product can be used in kittens from 8 weeks of age and with a minimum weight of 750 g, it is not recommended in cats under this weight.

Method of administration

The cat must stand in a comfortable position. Separate the hair from the back until the skin is visible (do not apply the content on the hair), discharge the content in a point, on the neck (cross) of the animal, over dry skin. Avoid contact with the mouth and eyes of the animal, avoid the licking of the animal and administer until the pipette is empty. A graphic description is included at the end of this document.

Interval between doses

A monthly application is recommended, although when used to control fleas and depending on the degree of infestation, you can control these parasites for up to 60 days. In order not to forget the next dose, stickers are included to be attached to the calendar.

RECOMMENDATIONS AND PRECAUTIONS

- Prevent the animal from licking during the application.
- Discard the pipette immediately after use.
- Keep the product out of the reach of children and pets.
- Consult the Veterinarian.
- Store between 15 °C and 30 °C. Store in a cool, dry place, protected from light.
- Do not allow treated cats to come in contact with surface waters for 48 hours after application to avoid adverse effects on aquatic organisms.
- Do not allow direct contact with the treated cat - especially children - for at least four hours after administration. Wait until the area of application is dry before allowing the cat to come in contact with furniture or equipment.
- Do not mix or apply together with another medication in the same place.
- Profelis® Drop On maintains its effectiveness, even if the treated cat gets wet or immersed in water. However, it is not recommended to bathe the animal with shampoo or immerse it within 48 hours after application. In case of very frequent baths with shampoo, the duration of the effectiveness of the medicine can be reduced.

SECURITY IN ANIMALS

- Only for use in cats. Do not use in other species.
- The product can be used in kittens from 8 weeks of age and with a minimum weight of 750 g, it is not recommended in cats under this weight.
- It has an excellent margin of safety, however, it is recommended to use according to the indicated.
- Studies carried out with the active components have not shown teratogenic or embryotoxic effects. However, the product should only be used in pregnant or lactating females on the recommendation of a veterinarian.
- In isolated and individual cases, in animals sensitive to any of the components, redness of the area, pruritus or other signs of discomfort may be observed in the areas of application that normally disappear after 24 hours. On very rare occasions, gastrointestinal adverse effects such as vomiting and diarrhea have been observed.
- The product is very safe, however, very young, geriatric, weakened animals or in concomitant medication could be more susceptible to signs of intoxication at doses higher than those indicated. The treatment is symptomatic, bathing the animal with water and detergent until the concentration of the product decreases on the skin of the animal.
- In case of accidental ingestion of the recommended dose, vomiting, salivation and diarrhea may occur, which should disappear without treatment.

SECURITY IN PEOPLE

- It can be fatal if swallowed.
- Do not drink, smoke or eat during the application.
- Wash hands before and after application.
- Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of contact wash with a lot of water.
- Do not eat or store with food.

COMMERCIAL PRESENTATION

Box containing 5 plastic pipettes with reusable protective cap x 1 mL.

Holder Ent. Resp. DVM: Umberto Calderón O. CMVP 2944
Reg. SENASA Peru: F.87.37.N.0264; Bolivia: SENASAG Reg. PUV- F N° 008844/18;
Reg. Nicaragua: 11785.

Profelis® and logo are trademarks of Agrovet Market S.A.



agrovetmarket
animal health






Av. Canadá 3792-3798, San Luis, Lima 15021 - Perú

Tel.: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

FREE SALE

Profelis® How to apply?



42186PER00002

V03.0719

DESARROLLO DE EMPAQUES

Nombre del Archivo:	Profelis Drop On / INSERTO (V03.0719).ai	Código:	42186PER00002
Coordinador:	Giovanni Anchorena	Diseño:	Karen Flores
Software:	Adobe Illustrator CS6	Fecha:	15-07-2019
Fuentes:	Sws721 LT BT Trebuchet MS, Arial Narrow		
Colores:	Negro		
Versión:	V03.0719	Díptico	
Destino:	Estradas	Ancho	Largo
		166 mm	210 mm
Observaciones:	V02.0718: Se agregó frase de Ecuador y Reg. Bolivia.		