

Tobrasone®

NUEVO

Asociación de Tobramicina con Dexametasona

Suspensión Oftálmica Estéril

**Trata efectivamente las
principales infecciones del
globo ocular y controla la
inflamación asociada**



petmedica®
Fortaleciendo vínculos

Tobrasone®

Suspensión Oftálmica Estéril

Tobrasone® es una combinación de tobramicina, un antibiótico aminoglucósido bactericida y dexametasona, un potente glucocorticoide sintético, con acción antiinflamatoria.

Composición

Cada mL contiene:

Tobramicina Sulfato	3 mg
Dexametasona Sulfato Fosfato	1 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones de Uso:

Tratamiento y prevención de infecciones externas del ojo y sus anexos causadas por gérmenes Gram + y Gram -, como *Staphylococcus aureus*, *Moraxella* spp., estreptococos y coliformes. Proporciona efecto antiinflamatorio.

- ☑ Blefaritis, conjuntivitis y/o queratoconjuntivitis bacterianas.
- ☑ Infección de córnea por *Staphylococcus aureus*.
- ☑ Coadyuvante en el tratamiento de infecciones intraoculares severas.
- ☑ Inflamación de la conjuntiva palpebral, bulbar, de la córnea y segmento anterior del ojo, cuando se acompañe de inflamación bacteriana o se corre el riesgo de desarrollarla.
- ☑ Abrasiones corneales y lesiones traumáticas superficiales del globo ocular.
- ☑ Queratitis seca contaminada y úlcera de córnea ocasionadas por microorganismos susceptibles, lesiones y/o infecciones en cámara anterior del ojo.
- ☑ Tratamiento preventivo y post-cirugías.



Vías de Administración y Dosis:

Vía tópica oftálmica. Se sugiere tratar ambos ojos a la vez, debido al riesgo de infección ocular unilateral a bilateral.

Infecciones oftálmicas moderadas:

Instilar 1-2 gotas en el fondo del saco conjuntival del ojo afectado en intervalos de 4-6 horas durante las primeras 24 - 48 horas. Disminuir la frecuencia de acuerdo a la evolución del caso, a una frecuencia no menor a 2 gotas cada 8 horas. Administrar por al menos 5 días.

Infecciones oftálmicas severas:

Instilar 2 gotas en el saco conjuntival del ojo afectado cada hora hasta lograr una mejoría evidente, continuando luego con 2 gotas cada 3-4 horas. Administrar por al menos 7 días.



Las dosis, frecuencias y duración son referenciales y pueden ser ajustadas a criterio médico veterinario. Se recomienda discontinuar la terapia al menos 48 horas después que la infección se ha controlado.