

TRIVANTEL® 10**1. GENERALIDADES**

- 1.1. **Nombre comercial:** TRIVANTEL® 10
- 1.2. **Clase de uso:** Antiparasitario Interno
- 1.3. **Formulación:** Suspensión Oral

2. COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de TRIVANTEL® 10 contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Triclabendazole	10	g
Excipientes c.s.p.	100	ml

3. INDICACIONES

Trivantel® 10 es un antiparasitario de acción total; para el control y tratamiento de la *Fasciola hepatica* (Alicuya); incluyendo casos de fasciolosis aguda, subaguda y crónica de bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y equinos. Su acción elimina las formas maduras e inmaduras (incluidas las inmaduras precoces) de *Fasciola hepatica* (Alicuya).

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y equinos.

5. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Bovinos: 1 mL por cada 12.5 kg (12 mg de Triclabendazole por kg de p.v.). En la práctica 4 mL/50 kg p.v.

Equinos, ovinos, caprinos y camélidos: 1 mL por cada 15 kg (10 mg de Triclabendazole por kg/p.v.).

6. SEGURIDAD

Trivantel® 10 es completamente seguro hasta 20 veces la dosis recomendada. Puede usarse sin ningún problema en hembras preñadas y animales jóvenes.

7. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No se recomienda su uso en animales debilitados o en simultáneo con baños o vacunaciones.
- Agitar antes de usar.

8. PERIODO DE RETIRO

Carne: 28 días, leche: No administrar en hembras productoras de leche para el consumo humano.

9. ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 8 – 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

10. PRESENTACIONES

Jeringa x 30ml, Frasco x 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 3.9L.