

## 1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Vetocam 200
- 1.2. Clase de uso: Antiinflamatorio, analgésico y antipirético
- 1.3. Formulación: inyectable.

## 2. COMPOSICION

Componente	Cantidad	Unidad
Meloxicam	20	mg
Excipientes c.s.p.	1	mL

## 3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Solución libre de impurezas.

## 4. DESCRIPCIÓN

Antiinflamatorio no esteroideo. Solución inyectable con acción Antiinflamatoria, Analgésica y Antipirética; COX-2 selectivo.

## 5. INDICACIONES

### Bovinos:

Utilizado para la reducción de los signos clínicos de infecciones respiratorias agudas en el ganado bovino, conjuntamente con una adecuada antibioterapia. Indicado para la reducción de los signos clínicos de la diarrea en terneros de más de una semana de edad y jóvenes terneros no lactantes, en combinación con una terapia oral de re-hidratación. Como terapia adyuvante para el tratamiento de la mastitis aguda, en combinación con una antibioterapia. Para el alivio del dolor pos-operatorio ocasionado por el descorne en terneros.

### Porcinos:

Utilizado para la reducir síntomas de la cojera e inflamación presentes en los desórdenes no infecciosos del aparato locomotor. Como terapia adyuvante para el tratamiento de la septicemia puerperal y la toxemia (Síndrome Mastitis-metritis-agalactia) junto con una apropiada antibioterapia.

### Equinos:

Para el alivio de la inflamación y el dolor presente en desordenes musculoesqueléticos tanto agudos como crónicos. Para el alivio del dolor asociado al cólico equino.

## 6. ESPECIES DE DESTINO

Formulación desarrollada y probada para su uso en bovinos, porcinos y equinos.

### 7. ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, subcutánea e intravenosa.

### 8. DOSIS

- Bovinos: 2.5 mL / 100 kg de peso corporal, vía subcutánea o intravenosa, en combinación con una adecuada antibioterapia o terapia de rehidratación oral.
- Porcinos: 2.0 mL/100 kg de peso corporal, vía intramuscular y en combinación con una apropiada antibioterapia. Si es requerido, administrar una segunda dosis después de 24 horas de la última aplicación.
- Equinos: 3.0 mL/100 kg de peso corporal vía intravenosa.

### 9. PRECAUCIONES

- Evitar usar el producto en animales severamente deshidratados, con hipovolemia o con hipotensión, los cuales requieren hidratación parenteral, siendo así un riesgo potencial de toxicidad renal.
- Durante la anestesia, se debe considerar el monitoreo y la fluido terapia. No se debe administrar ninguna terapia adicional con meloxicam u otros AINES en gatos.
- Puede inhibir la agregación plaquetaria y también causa ulceración gastrointestinal, si se emplea con otros fármacos que alteran la hemostasis, (por ejemplo, heparina, warfarina) y/o que causan erosión gastrointestinal, no combinar con otros AINES o corticosteroides.
- No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Agroveter Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

### 10. CONTRAINDICACIONES

- No usar en caso pacientes con hipersensibilidad al compuesto (en caso de anafilaxia administrar epinefrina parenteralmente), con sangrado o ulceración gastrointestinal, disfunción hepática, cardíaca o renal y con anomalías hemorrágicas.
- Animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos pues aumenta la posibilidad de nefrotoxicidad.
- No usar en animales gestantes o lactantes.
- Para el tratamiento de la diarrea en terneros, no usar en animales menores de 1 semana de edad.
- No usar en cerdos menores de 2 días de edad.

### 11. PERIODO DE RETIRO

#### Carne:

Bovinos: 15 días

Porcinos y Equinos: 05 días

Leche: 05 días

### 12. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente de 15 – 30°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Protégase de la luz solar directa.

Manténgase alejado del alcance de los niños.

La eliminación debe ser de acuerdo con las regulaciones federales, estatales / provinciales y / o locales. La incineración es el método preferido de eliminación, cuando sea apropiado.

### 13. PRESENTACIÓN

Frascos, de 10mL, 20mL, 50mL, 100mL, 250mL y 500 mL.

## Vetocam 200

### 1. GENERAL

- 1.1. Commercial name: Vetocam 200
- 1.2. Use class: Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic
- 1.3. Formulation: Injectable solution

### 2. COMPOSITION

Component	Quantity	Unit
Meloxicam	20	mg
Excipients q.s.ad.	1	mL

### 3. PHSYCOCHEMICAL PROPERTIES

- 3.1. Aspect: free impurities solution.

### 4. DESCRIPTION

Nonsteroidal anti-inflammatory. Injectable solution with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic action; COX-2 selective.

### 5. INDICATIONS

#### Bovines:

Used for the reduction of clinical signs of acute respiratory infections in cattle, together with adequate antibiotic therapy. Indicated for the reduction of clinical signs of diarrhea in calves over one week old and young non-lactating calves in combination with oral rehydration therapy. For postoperative pain relief in calves caused by dehorning.

#### Swine:

Used to reduce the symptoms of lameness and inflammation present in non-infectious locomotor disorders. As adjunctive therapy for the treatment of puerperal septicemia and toxemia (Mastitis-metritis-agalactia syndrome) with appropriate antibiotic therapy.

#### Horses:

For relief of inflammation and pain in both acute and chronic musculoskeletal disorders. For relief of pain associated with equine colic.

### 6. TARGET ANIMALS

Formulation developed and tested for its use in cattle, swine and horses.

### 7. ADMINISTRATION

Intramuscular, subcutaneous and intravenous.

### 8. DOSAGE

- Cattle: 2.5 mL /100 kg, by subcutaneous or intravenous route in combination with appropriate antibiotics or oral rehydration therapy.
- Swine: 2.0 mL / 100 kg of body weight, intramuscularly, and in combination with an appropriate antibiotic. If required, administer a second dose 24 hours after from last application.
- Horses: 3.0 mL/100 Kg bw by intravenous route.

### 9. PRECAUTIONS

- Avoid using the product in very severely dehydrated animals with hypovolemia or hypotension, which require parenteral hydration, making it a potential risk of renal toxicity.
- During anesthesia, you should consider monitoring and fluid therapy. Do not administer any additional therapy with meloxicam or other NSAIDs in cats.
- Can inhibit platelet aggregation and cause gastrointestinal ulceration, if used with other drugs affecting hemostasis (e.g., heparin, warfarin) and / or that cause gastrointestinal erosion, not combine with other NSAIDs or corticosteroids.
- Do not mix in the same container with any other substance foreign to the product.
- Do not handle this product if you know you are sensitized or if you have been advised not to work with such preparations.
- Keep out of reach of children.
- Agroveter Market SA is not responsible for the consequences of using (the product) other than described in this insert.

### 10. CONTRAINDICATIONS

- Do not use in patients with hypersensitivity to the compound (in case of anaphylaxis administer epinephrine parenterally), gastrointestinal bleeding or ulceration, impaired hepatic, cardiac or renal function and bleeding abnormalities.
- Animals dehydrated, hypovolaemic or hypotensive because it increases the possibility of nephrotoxicity.
- Do not use in pregnant or lactating animals.
- For the treatment of diarrhea in calves, do not use in animals less than 1 week old.
- Do not use in pigs less than 2 days old.

### 11. WITHDRAWAL PERIOD

Cattle (meat and offal): 15 days; Swine (meat and offal): 5 days

Milk: 5 days

### 12. STORAGE

Store at room temperature between 15 ° C and 30 ° C, in a cool dry place. Protect from direct sunlight. Disposal should be in accordance with local, state / provincial and / or local federal regulations. Incineration is the preferred method of removal, where appropriate. Keep away from children.

### 13. PRESENTATION

Flasks of 10mL, 20mL, 50mL, 100mL, 250mL and 500 mL.