

NUEVO

Uso veterinario



**Sin picazón, sin prurito,
sin estrés, sin esfuerzo**

Xintópica®

Oclacitinib maleato



Soft Chews

Tabletas Blandas Masticables

petmedica



Xintópica® Soft Chews

Oclacitinib maleato

1.5 mg | 3 mg | 6 mg | 12 mg

CONTROL DE LA DERMATITIS ATÓPICA Y ALIVIO
SOSTENIDO DEL PRURITO ASOCIADO CON LA
DERMATITIS ALÉRGICA EN PERROS.

Xintópica® Soft Chews está indicado para el tratamiento del prurito canino agudo o crónico asociado con dermatitis alérgica en perros (DAPP), la dermatitis atópica y la sarna sarcóptica.

Xintópica® permite continuar el diagnóstico de la causa subyacente, test de alergias y/o serológicos.



SIN EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS AL USO DE CORTICOIDES

El oclacitinib se considera una mejor opción frente al uso de corticoides (como la prednisona o la dexametasona) que causan un efecto inmunosupresor más amplio y generalizado, cuyo uso a largo plazo no es sostenible.




CONTROL DE RÁPIDA ACCIÓN

Xintópica® Soft Chews controla el prurito en menos de 4 horas*, aliviándolo de forma rápida, efectiva y segura. En reportes de campo se demuestra la efectividad del producto, reduciendo significativamente el prurito y la severidad de la dermatitis alérgica canina en solo una semana.

(*) Krklec S, Lescano A, Torres V. 2024. Efectividad de uso de una tableta masticable a base de oclacitinib para el control de prurito en caninos con dermatitis alérgica.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL OCLACITINIB

Xintópica® Soft Chews contiene **oclacitinib**, un inhibidor de la quinasa Janus (**JAK**), interfiriendo así con la vía de señalización **JAK-STAT**. Inhibe selectivamente las citoquinas proinflamatorias, aliviando los síntomas alérgicos, pruriginosos e inflamatorios con un impacto mínimo en el sistema inmune. En concreto, oclacitinib inhibe la IL-31, una importante citocina pruritogénica en perros atópicos, así como citoquinas proinflamatorias como la IL-2, IL-4, IL-6 e IL-13 que también desempeñan un papel importante en la dermatitis atópica canina.



ROMPE EL CICLO DEL PRURITO
Y LA PICAZÓN Y RECUPERA LA
CALIDAD DE VIDA DE TUS
PACIENTES CON **XINTÓPICA®**

ALTAMENTE PALATABLE

Un gran sabor determina la adherencia al tratamiento y al éxito terapéutico en tu paciente.

Xintópica® Soft Chews está diseñado para una ingesta voluntaria y placentera, sin necesidad de forzar la administración.

- SUAVE CONSISTENCIA
- ATRACTIVO OLOR Y SABOR
- ALTA ACEPTACIÓN
- DESINTEGRACIÓN TOTAL
- PRACTICO Y VERSÁTIL



Xintópica® Soft Chews

Oclacitinib maleato

DOSIS RECOMENDADA

Se administra por vía oral, a razón de 0.4 – 0.6 mg/kg cada 12 horas durante un máximo de 14 días, después 0.4 – 0.6 mg/kg cada 24 horas como terapia de mantenimiento.

Disponible en 4 presentaciones de 32 tabletas blandas masticables. Puede utilizar el cortador de tabletas ofrecido dentro de la caja de Xintópica® para ofrecer una dosis exacta de acuerdo al peso del perro.

	1.5 mg	3 mg	6 mg	12 mg
2.5 a 3.7 kg				
3.8 a 4.9 kg				
5 a 7.5 kg				
7.6 a 10.5 kg				
10.6 a 15 kg				
15.1 a 20 kg				
20.1 a 30 kg				
30.1 a 45 kg				
45.1 a 60 kg				
Diámetro	11.3 - 13 mm	14 - 16.29 mm	11.3 - 13 mm	14 - 16.29 mm



PUUEEE UUTILLIZARSE EN PERROS DESDE LOS 12 MESES Y 2.5 KG