

Zemethis®

Maropitant

NUEVO



Tratamiento efectivo
contra náuseas y
vómitos

Uso veterinario




petmedica⁺

Zemethis®

Maropitant

Control eficaz y seguro del vómito

Zemethis®, gracias a su principal compuesto **maropitant**, actúa directamente sobre este centro del vómito bloqueando la sustancia P, el principal neurotransmisor implicado en la emesis. Su acción como antagonista de los receptores NK-1, previene eficazmente los vómitos de origen tanto central como periférico, ya sea por causas neurológicas, químicas o emocionales. Además, reduce el dolor visceral, y disminuye los requerimientos anestésicos. No altera el vaciado gástrico ni el tránsito intestinal, aunque puede modificar ligeramente la motilidad del intestino delgado.



Zemethis® 1%

Solución Inyectable

- Rápida aplicación y eficacia a la hora de acción²
- Menor dolor al momento de la aplicación en comparación con otros productos del mercado³
- Prevención de náuseas y vómitos perioperatorios y mejora la recuperación de la anestesia general
- No necesita refrigeración
- Flexibilidad: Presentación inyectable de 20mL y 50 mL de acuerdo a las necesidades de la clínica



(1) Chávez L. 2022. Evaluación de la palatabilidad de una tableta masticable a base de maropitant en caninos. (2) Flores L, Krllec S, Torres V. 2024. Efectividad de una solución de la inyección subcutánea de tres formulaciones en caninos.

Factor Fear Free

BIENESTAR FRENTE A LA EMESIS

Zemethis® Soft Chews minimiza el miedo, la ansiedad y el estrés asociados a los tratamientos convencionales; brindando una administración sencilla que no genera experiencias negativas en pacientes, dueños de mascotas y médicos veterinarios. Esto se traduce en una mejor aceptación del tratamiento por parte del animal, una recuperación más tranquila y una relación más positiva con el entorno veterinario.



Presentación oral única en el mercado



Formulación inyectable a base de Alcohol Benzílico que reduce el dolor



Eficacia superior en comparación a otros agentes eméticos.



Zemethis® Soft Chews

Tabletas Blandas Masticables

- Presentación oral única en el mercado
- Alta palatabilidad comprobada¹
- Prevención de los vómitos por cinetosis (mareo en el viaje)
- Flexibilidad: Disponible en las presentaciones de 15mg, 30mg, 60mg y 120mg de acuerdo a las necesidades de la mascota.

ción inyectable a base de maropitant en el tratamiento de la emesis continua en caninos. (3) Flores L, Krklec S, Torres V. 2024. Comparación de la respuesta al dolor después

Dosis y vía de administración

Zemethis® 1%



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VÓMITO AGUDO

Vía subcutánea o intravenosa, una vez al día, en una dosis de 1 mg de maropitant/kg de peso vivo (1 mL/10 kg de peso vivo) durante un máximo de cinco días consecutivos.



Frasco de 20 mL y 50 mL

Zemethis® Soft Chews

15 mg | 30 mg | 60 mg | 120 mg



PREVENCIÓN DE VÓMITOS INDUCIDOS POR CINETOSIS O MAREO EN EL VIAJE (solo para perros de 16 semanas o más)

Una vez al día, a una dosis mínima de 8 mg/ de maropitant por kg de

		Peso del perro en Kg											
		1.3 a 1.8 kg	1.9 a 2.8 kg	2.9 a 3.7 kg	3.8 a 5.6 kg	5.7 a 7.5 kg	7.6 a 11.2 kg	11.3 a 15 kg	15.1 a 22.5 kg	22.6 a 30 kg	30.1 a 45 kg	45.5 a 52.5 kg	52.6 a 60 kg
Presentación	15 mg												
	30 mg												
	60 mg												
	120 mg												



Caja de 4 y 32 tabletas en blíster aluminizado sellado

Consideraciones de Uso

- En perros con vómitos activos, se recomienda iniciar el tratamiento con Zemethis® 1% solución inyectable. Posteriormente, puede utilizarse Zemethis® Tabletas Blandas Palatables para la prevención de los vómitos agudos.
- Para prevenir los vómitos, debe administrarse con 45 a 60 minutos de antelación. La duración del efecto es de aproximadamente 24 horas, por lo que, el tratamiento puede administrarse la noche previa a la administración de un agente emetógeno.
- La causa subyacente de los vómitos agudos debe ser identificada y tratada en perros que reciben Zemethis®. Si los vómitos persisten a pesar del tratamiento, debe reevaluarse el caso.