



agrovvetmarket
animalhealth

AMOXYCOL® WS

Polvo Soluble

Potente Combinación Antibiótica Betalactámica-Polipéptido de Amplio Espectro



Formulación

Cada 100 g contiene: Amoxicilina base 20 g, Colistina (como sulfato) 4 g (equivalente a 12 000 000 UI), excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina y/o colistina: Infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urogenital e infecciones de piel y tejidos blandos y prevención de infecciones bacterianas secundarias. Aves: Infecciones respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, enteritis necrótica ulcerativa, estafilo y estreptococosis, coriza, onfalitis e infección del saco vitelino, saculitis, sinusitis, sinovitis, dermatitis gangrenosa. Cerdos: Infecciones respiratorias inespecíficas, rinitis atrófica, enterotoxemia causada por E. coli (enfermedad del edema), colibacilosis entérica, salmonelosis, diarrea neonatal, diarrea de los lechones, diarrea posdestete, diarreas bacterianas, corinebacteriosis, erisipelosis, leptospirosis, dermatitis, entre otras. Prerumiantes: infecciones respiratorias, entéricas, diarreas por Salmonella spp. y E. coli.

Dosis y Administración

Aves: Preventivo: 1 kg / 2,000 L de agua (o en 1,000 kg de alimento) durante 3-5 días. Tratamiento: 1kg/1,500- 2,000 L agua (o en 750-1,000 kg de alimento) durante 3-5 días. Cerdos: Preventivo: 1 kg / 1,500 L agua (o en 750 kg de alimento) durante 3-5 días. Tratamiento: 1kg/1,000-1,500 L agua (o en 500-750 kg de alimento) durante 3-5 días. Individual: 1-2 g/10 kg pv. Terneros, corderos, caprinos y camélidos jóvenes: Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 Kg por 3-5 días (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

Presentación Comercial

Sobre x 100 g, Sobre x 500 g, Sobre x 1 kg, Sobre x 15 g,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.26.I.1703

