

CEFAXAM® 4000/2000

Polvo con Diluyente

Cefalosporina de Tercera Generación de Amplio Espectro con Inhibidor de Betalactamasas - Infecciones Complicadas y Resistentes



Formulación

Cefaxam® 4000/2000 Cada frasco con polvo contiene: Ceftriaxona Sódica (eq. a Ceftriaxona)..... 4000 mg Sulbactam Sódico (eq. a Sulbactam)..... 2000 mg Cada frasco con diluyente contiene: Diluyente estéril 10 mL

Indicaciones

Cefaxam® está indicado en infecciones causadas por patógenos sensibles a la Ceftriaxona y Sulbactam incluyendo productores de betalactamasas. La asociación está indicada en: - Infecciones intraabdominales (peritonitis, de las vías biliares), óseas y articulares, de tejidos blandos, dermatológicas, meningitis, renales y de las vías genito-urinarias, infecciones de las vías respiratorias, en particular neumonía, mastitis e infecciones de oído, nariz y garganta, septicemias bacterianas. - Profilaxis perioperatoria de infecciones. Una dosis única administrada antes de la operación reduce al mínimos la posibilidad de una infección posoperatoria. - Infecciones complicadas, causadas por patógenos resistentes a múltiples fármacos, incluyendo cepas productoras de betalactamasa y metalobetalactamasas. - Enfermedad de Lyme (borreliosis) causada por *Borrelia burgdorferi*.

Dosis y Administración

Cefaxam® se administra por vía intravenosa lenta o subcutánea. Agregue el diluyente que acompaña al producto, agite vigorosamente hasta disolver el polvo y administre inmediatamente. La dosis general es de 15 a 50 mg de Ceftriaxona + 7.5 a 25 mg de Sulbactam por Kg en caninos -una o dos veces al día-, y de 25 a 50 mg de Ceftriaxona + 12.5 a 25 mg de Sulbactam/Kg en felinos - dos veces al día. Esto se representa en ml como: Caninos: 1ml/1-3.3kg y Felinos: 1ml/1-2kg



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Presentación Comercial