

CONTRADIAL® WS

Polvo para Suspensión Oral

Antibiótico - Antiespasmódico - Adsorbente
antitóxico - Protector de mucosa - Vitaminado



Formulación

Cada 12 g contienen: Neomicina Sulfato 400 mg, Estreptomicina Sulfato 400 mg, Sulfaguanidina 4 g, Caolín 4 g, Pectina 400 mg, Bismuto Subnitrito 2 g, Vitamina A acetato 80,000 UI, Excipientes c.s.p. 12 g.

Indicaciones

Tratamiento y control de diarreas, enteritis bacteriana (colibacilosis, salmonelosis, disentería), enterotoxemia, enterocolitis, gastroenteritis y otros trastornos digestivos debidos a microorganismos sensibles, indigestión, impactación y otros síntomas. Antidiarreico y antiséptico intestinal. Protector de la mucosa intestinal (de toxinas, gases u otras sustancias tóxicas de origen orgánico o inorgánico).

Dosis y Administración

Vía oral, como toma individual o disuelto en el agua de bebida, leche o mezclada en el alimento. Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos: 3-6 g/10 kg de peso. En el agua de bebida, cerdos: 1 kg/250-300 L. Aves: 1 kg/150-200 L. Repetir la dosis a las 12 horas de ser necesario. Como toma individual, disolver la dosis en cantidad suficiente de agua o leche, agitar bien y administrar con sonda o botella.

Presentación Comercial

Registro Senasa

F.082.070.I.01064



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.