

DUOCORTYL® AC

Suspensión Inyectable

Antiinflamatorio - Inmunosupresor - Antialérgico -
Antitóxico - Gluconeogénico



Formulación

Cada 1 mL contienen: Prednisolona (como acetato) 7.5 mg, Dexametasona (como sodio fosfato) 2.5 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

- Procesos inflamatorios no infecciosos, en especial inflamaciones musculo esqueléticas (artritis, artrosis, tendovaginitis, bursitis, luxaciones, miositis y torceduras entre otras lesiones). - Enfermedades infecciosas agudas -asociado a antibioterapia-: osteoartritis, linfangitis, artritis, bronconeumonías, septicemias, colienterotoxemia, mastitis e infecciones del tracto urogenital, otitis, trastornos oculares¹, dermatitis, flemones entre otras. - Inmunosupresión en casos de condiciones alérgicas como anafilaxia, asma, afecciones no específicas de la piel (dermatitis atópica, urticaria, prurito), laminitis, picaduras, mordedura de serpientes, alergias medicamentosas y en casos de enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso, artritis reumatoide y otras; así como en procesos tumorales y otras condiciones. - Terapias de emergencia, tales como estado de choque y colapso circulatorio (p.e. anafilaxia, envenenamiento, etc). - Condiciones de estrés físico (p.e. trastornos febriles, traumatismos, cirugías, debilidad, quemaduras) - Afecciones endocrinas suprarrenales, en pacientes con insuficiencia suprarrenal conocida o cuando existan dudas sobre sus reservas adrenocorticales.

Dosis y Administración

Vía inyectable intramuscular o subcutánea. Agitar antes de usar. Caninos: 0.2 – 0.6 mL, felinos: 0.1 – 0.3 mL. Las dosis pueden ser ajustadas según la patología a tratar, de acuerdo con criterio del médico veterinario. Por lo general, se logra el resultado deseado luego de una sola aplicación. En caso de ser necesario un tratamiento de sostén luego de logrado el efecto terapéutico inicial, el mismo se efectuará a dosis reducidas, fijadas a criterio del profesional médico veterinario. No administrar por más de 5 días.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Presentación Comercial