DURAMYCIN® 300 L.A.

Solución Inyectable

Antibiótico de larga acción sostenida





Formulación

Oxitetraciclina (como dihidrato) 300 mg, vehículo de larga acción c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de procesos infecciosos o como preventivo en animales sometidos a estrés y/o a un alto riesgo de contraer infecciones (por ejemplo en la “medicación en masa” como tratamiento preventivo contra la enfermedad respiratoria bovina). Infecciones sistémicas y locales, bronconeumonías, mastitis, enteritis, artritis, metritis, infecciones del tracto urinario, pododermatitis, queratoconjuntivitis, entre otras.

Dosis y Administración

1 mL/10 kg de p.v.en infecciones muy graves y/o una duración de actividad prolongada (6 a 7 días); para infecciones moderadas a leves y/o una duración de actividad mediana (3 a 4 días): 1 mL/15 kg de p.v. Aplicar vía intramuscular profunda o subcutánea.

Presentación Comercial

Frasco x 100 mL, Frasco x 250 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.01.N.0855

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.