



# FLUNIQUEST® C500

## Gránulos multiuso

Antiinflamatorio, antipirético, antitóxico y analgésico no esteroide. Específico para el dolor visceral y músculoesquelético



## Formulación

Cada 100g gránulos microencapsulados contiene: Flunixin (como flunnixin meglumine) 5g, excipientes c.s.p 100g.

## Indicaciones

Equinos: Alivio de la inflamación y el dolor asociados con los trastornos músculo esqueléticos y el alivio del dolor visceral asociado con el cólico. Fiebre, enfermedades infecciosas junto a antibioterapia. Porcinos: Alivio de la fiebre -principalmente asociada con la enfermedad respiratoria porcina-, anorexia, dolor y de los síntomas subclínicos inducidos por las endotoxinas. Inflamación y dolor asociados con trastornos músculo esqueléticos, descole, castración, descolmillado, etc. En cerdas, control de mastitis, metritis y agalaxia después del parto.

## Dosis y Administración

Vía oral en el alimento. Equinos: 1.1 mg/kg de peso corporal al día. En la práctica: 1 g de fluniQuest® C500 por cada 45 kg de peso vivo, administrado con el alimento; una vez al día, durante 3-5 días. Los gránulos se administran fácilmente rociando una pequeña cantidad de alimento. En casos agudos, el tratamiento puede administrarse inicialmente mediante inyección intravenosa o intramuscular de solución de flunixin meglumine (Flunimine® x ejm), seguido de fluniQuest® C500 en los días 2 a 5. El tratamiento no debería exceder los 5 días consecutivos. Porcinos: 1-2 mg/kg de peso corporal al día. En la práctica: 1 Kg por 1-2 TM de alimento. Tratar una o dos veces al día durante 5-7 días seguidos dependiendo del caso. La dosis puede ser mayor en el primer tratamiento o de encontrarse con un caso grave.

## Presentación Comercial



Este documento es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.