

HISTACORT® AC

Suspensión Inyectable

Potente Asociación Sinérgica Antialérgica de Doble Mecanismo de Acción



Formulación

Cada mL contiene: Prednisolona (como acetato)..... 10
mg Clorfenamina maleato..... 4 mg
Excipientes..... c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Tratamiento sintomático de patologías asociadas a la liberación de histamina y como antiinflamatorio corticoide siempre que se requiera un efecto antihistamínico. Reacciones alérgicas en general, anafilaxia¹, dermatosis/dermatitis alérgicas, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis por picaduras, prurito² (independientemente de su causa) e inflamación alérgicas asociados a la dermatitis alérgica, parasitaria, pustulosa e inespecífica y la otitis. Reacciones medicamentosas y alimenticias, picaduras, urticaria. Alergias respiratorias, rinitis alérgica, polinosis, alergias oculares, trastornos oftálmicos inflamatorios³ cuando esté indicada la corticoterapia sistémica, bronquitis alérgica (asma), estados de choque. Traqueobronquitis, bronquitis, incluidas todas las bronquitis alérgicas. Broncoespasmos, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades artríticas y reumáticas, artropatías, enfermedades) autoinmunes, bursitis entre otras; siempre que se requiera un efecto corticoide asociado al antihistamínico.

Dosis y Administración

Vía inyectable intramuscular o subcutánea. Caninos y felinos, a razón de: prednisolona: 1 mg/kg y clorfeniramina: 0.4 mg/kg de peso vivo. En la práctica: 1 mL/10 kg de peso vivo. Las dosis pueden ser ajustadas de acuerdo a criterio del médico veterinario. Histacort® AC puede administrarse a animales que sufran infecciones bacterianas agudas o crónicas, siempre que la infección se controle con agentes antibióticos o quimioterapéuticos adecuados.

Presentación Comercial



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.