HISTACORT® AC

Suspensión Inyectable

Potente Asociación Sinérgica Antialérgica de Doble Mecanismo de Acción



Formulación

Cada mL contiene: Prednisolona (como acetato)……..... 10 mg Clorfenamina maleato……..……..... 4 mg
Excipientes…….. c.s.p. ……..……..... 1 mL

Indicaciones

Tratamiento sintomático de patologías asociadas a la liberación de histamina y como antinflamatorio corticoide siempre que se requiera un efecto antihistamínico. Reacciones alérgicas en general, anafilaxia1 , dermatosis/dermatitis alérgicas, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis por picaduras, prurito2 (independientemente de su causa) e inflamación alérgicos asociados a la dermatitis alérgica, parasitaria, pustulosa e inespecífica y la otitis. Reacciones medicamentosas y alimenticias, picaduras, urticaria. Alergias respiratorias, rinitis alérgica, polinosis, alergias oculares, trastornos oftálmicos inflamatorios3 cuando esté indicada la corticoterapia sistémica, bronquitis alérgica (asma), estados de choque. Traqueobronquitis, bronquitis, incluidas todas las bronquitis alérgicas. Broncoespasmos, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades artríticas y reumáticas, artropatías, enfermedades) autoinmunes, bursitis entre otras; siempre que se requiera un efecto corticoide asociado al antihistamínico.

Dosis y Administración

Vía inyectable intramuscular o subcutánea. Caninos y felinos, a razón de: prednisolona: 1 mg/kg y clorfeniramina: 0.4 mg/kg de peso vivo. En la práctica: 1 mL/10 kg de peso vivo. Las dosis pueden ser ajustadas de acuerdo a criterio del médico veterinario. Histacort® AC puede administrarse a animales que sufran infecciones bacterianas agudas o crónicas, siempre que la infección se controle con agentes antibióticos o quimioterapéuticos adecuados.

Presentación Comercial

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.