NEO-TERRACICLINA® WS



Polvo Soluble

Combinación Antibiótica de Amplio Espectro y Doble Efecto

Formulación

Cada 100 g contiene: Oxitetraciclina (clorhidrato) 20 g, Neomicina (sulfato) 20 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes Gram-positivos o Gram-negativos sensibles a la oxitetraciclina y/o neomicina, principalmente infecciones respiratorias y gastrointestinales, prevención de infecciones bacterianas secundarias y prevención de la mortalidad temprana. Diarreas, enteritis inespecíficas, enterotoxemias, salmonelosis, colibacilosis, disentería, cólera, coriza, neumonías inespecíficas, rinitis atrófica, enfermedad respiratoria crónica, aerosaculitis, sinovitis, onfalitis, conjuntivitis, MMA, hexamitiasis, infecciones secundarias a cuadros virales entre otras. Promotor de crecimiento.

Dosis y Administración

Vía oral mezclado en el agua de bebida (o vía alimento). Aves: Promotor: 200 - 250 g/1000 kg alimento. Preventivo: 250 - 500 g/1000 litros de agua o 500 kg de alimento. Tratamiento: 500 g - 1 kg/1000 litros de agua o 500 kg de alimento por 3 - 5 días. Cerdos: Promotor: 200 - 250 g/1000 kg alimento. Preventivo: 250 g/1000 litros de agua o 400 kg/alimento. Tratamiento: 500g - 1 kg/1000 litros de agua o 400 kg/alimento, por 4 - 5 días. Prerrumiantes: Preventivo: 60 mg del producto/kg de peso vivo (0.6 g/10 kg de p.v. diario); tratamiento: 120 mg/kg de p.v. (1.2 g/10 kg de p.v. diario) durante 4 - 5 días (en agua, leche o alimento). Cuyes y conejos: Preventivo: 50 g/100 litros de agua. Tratamiento: 100 g/100 litros de agua 3 - 5 días.

Presentación Comercial

Pote x 1 Kg, Sobre x 15 g, Pote x 100 g,

⚠ Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Registro Senasa

SENASA Perú: F-03-26-N-1806

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.