SURALAN® QUATTRO® SMALL



Tabletas Blandas Palatables

Ecto-endoparasitario de Múltiple Acción, Baja Dosis y 5 Semanas de Protección

Formulación

Cada tableta masticable de 2000 mg contiene: Sarolaner (S-Sarolaner): 20.00 mg Moxidectina: 0.24 mg Pirantel (como embonato): 50.00 mg Arpraziquantel (R-Praziquantel): 25.00 mg Excipientes y saborizantes c.s.p. 1 tableta

Indicaciones

Suralan® Quattro® está indicado para el tratamiento de perros con, o en riesgo de infestaciones parasitarias mixtas causadas por endoparásitos y ectoparásitos, siempre que se requiera una acción simultánea contra pulgas, garrapatas, ácaros, nematodos (incluyendo gastrointestinales, pulmonares, oculares y del corazón) y cestodos (tenias), previniendo además la dirofilariosis y la angiostrongilosis.

Dosis y Administración

Vía de Administración: Oral Dosis: Peso del perro: 5 - 10 kg Dosis: 1 tableta cada 35 días (5 semanas) Dosis por principio activo: Sarolaner: 2-4 mg/kg Moxidectina: 0.024-0.048 mg/kg Pirantel: 5-10 mg/kg Arpraziquantel: 2.5-5 mg/kg Modo de Administración: Puede administrarse sin o con alimento (antes o después de haber comido) Tableta palatable, suave y masticable para facilitar la administración Si el perro no la consume voluntariamente, puede administrarse con alimento o colocando la tableta en la parte posterior profunda de la lengua No dividir las tabletas Frecuencia según condición: Pulgas y garrapatas: una vez cada 35 días durante la temporada Sarna sarcóptica: administración mensual durante al menos 2 meses consecutivos Sarna demodécica: una vez al mes durante al menos 3 meses consecutivos (continuar hasta obtener raspados cutáneos negativos en al menos 2 ocasiones consecutivas con intervalo de 1 mes) Sarna otodéctica: dosis única suficiente (revisión veterinaria recomendada; control veterinario a los 28 días) Nematodos gastrointestinales: dosis única para infestaciones activas, luego mensual como preventivo Dirofilariosis y angiostrongilosis: intervalos mensuales en zonas endémicas (continuar hasta al menos 1 mes después de la última exposición a mosquitos) Angiostrongilosis (tratamiento): dosis única (revisión veterinaria a los 30 días) Cestodos: aplicar una vez como tratamiento único, luego mensual como preventivo Consideraciones especiales: Puede utilizarse desde las 8 semanas de edad y 1.25 kg de peso

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.