TYLO-SULPRIM®



Solución Inyectable

Antibiótico. Asociación antibiótica sinérgica de amplio espectro

Formulación

Cada 1 mL contienen: Tilosina Tartrato 50 mg Sulfametoxipiridazina 150 mg Trimetoprima 30 mg Excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Tylo-Sulprim® está indicada para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, digestivo, infecciones del tracto urogenital, neumonía, colibacilosis, mastitis, metritis, enteritis y otras enfermedades infecciosas en bovinos, ovinos, caprinos y aves de corral, causadas por gérmenes sensibles a la combinación de sulfametoxipiridazina, trimetoprim y tilosina. Bovinos, ovinos y caprinos: Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida, Arcanobacterium pyogenes o Fusobacterium necrophorum, infecciones digestivas causadas por E. coli y otros cuadros infecciosos (colisepticemia, poliartritis, difteria de los terneros, infecciones del ombligo), para reducir la incidencia de abscesos hepáticos causados por Fusobacterium necrophorum y Arcanobacterium. (Corynebacte rium spp., Actinomyces spp.) pyogenes, Infecciones podales causadas por Fusobacterium necrophorum. Cerdos: Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus Pleuropneumoniae, infecciones urogenitales de origen bacteriano (cistitis, vaginitis, uretritis, endometritis, metritis, nefritis), infecciones digestivas de origen bacteriano (gastroenteritis, colibacilosis, colienterotoxemia, salmonelosis, diarreas bacterianas), ileitis (causada por Lawsonia intracellularis y otros patógenos sensibles a la tilosina), para el tratamiento de disentería porcina asociada con Brachyspira (Serpulina, Treponema) hyodysenteriae, Artritis micoplásmica causada por Mycoplasma hyosynoviae, infecciones causadas por Streptococcus spp. y Haemophilus parasuis. Aves: Infecciones respiratorias de origen bacteriano (Enfermedad Respiratoria Crónica y Enfermedad Respiratoria Crónica Complicada asociada con E. coli, coriza infecciosa provocada por cepas de Avibacterium paragallinarum, complicaciones de bronquitis y laringitis infecciosa), infecciones digestivas (gastroenteritis, Colibacilosis, colienterotoxemia, Salmonelosis, diarreas bacterianas).

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Dosis y Administración

Intramuscular. Bovinos: 10 mL por cada 100 kg de peso corporal. Terneros/Ovejas/Cabras: 0,5 - 3

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.