

TYLO-SULPRIM®

Solución Inyectable

Antibiótico. Asociación antibiótica sinérgica de amplio espectro



Formulación

Cada 1 mL contienen: Tilosina Tartrato 50 mg Sulfametoxipiridazina 150 mg Trimetoprima 30 mg Excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Tylo-Sulprim® está indicada para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, digestivo, infecciones del tracto urogenital, neumonía, colibacilosis, mastitis, metritis, enteritis y otras enfermedades infecciosas en bovinos, ovinos, caprinos y aves de corral, causadas por gérmenes sensibles a la combinación de sulfametoxipiridazina, trimetoprim y tilosina. Bovinos, ovinos y caprinos: Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*, *Arcanobacterium pyogenes* o *Fusobacterium necrophorum*, infecciones digestivas causadas por *E. coli* y otros cuadros infecciosos (colisepticemia, poliartritis, difteria de los terneros, infecciones del ombligo), para reducir la incidencia de abscesos hepáticos causados por *Fusobacterium necrophorum* y *Arcanobacterium*. (*Corynebacterium* spp., *Actinomyces* spp.) *pyogenes*, Infecciones podales causadas por *Fusobacterium necrophorum*. Cerdos: Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus Pleuropneumoniae*, infecciones urogenitales de origen bacteriano (cistitis, vaginitis, uretritis, endometritis, metritis, nefritis), infecciones digestivas de origen bacteriano (gastroenteritis, colibacilosis, colienterotoxemia, salmonelosis, diarreas bacterianas), ileitis (causada por *Lawsonia intracellularis* y otros patógenos sensibles a la tilosina), para el tratamiento de disentería porcina asociada con *Brachyspira* (*Serpulina*, *Treponema*) *hyodysenteriae*, Artritis micoplásmica causada por *Mycoplasma hyosynoviae*, infecciones causadas por *Streptococcus* spp. y *Haemophilus parasuis*. Aves: Infecciones respiratorias de origen bacteriano (Enfermedad Respiratoria Crónica y Enfermedad Respiratoria Crónica Complicada asociada con *E. coli*, coriza infecciosa provocada por cepas de *Avibacterium paragallinarum*, complicaciones de bronquitis y laringitis infecciosa), infecciones digestivas (gastroenteritis, Colibacilosis, colienterotoxemia, Salmonelosis, diarreas bacterianas).



Dosis y Administración

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Intramuscular. Bovinos: 10 mL por cada 100 kg de peso corporal. Terneros/Ovejas/Cabras: 0,5 - 3