TYLVAX® C PX

Premix

Asociación Sinérgica Tetraciclina - Macrólido de Última Generación y Amplio Espectro



Formulación

Tilvalosina (como tartrato) 2 g, Clortetraciclina (como clorhidrato) 20 g, Excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Para el tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas, respiratorias, mixtas y/o complicadas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina y clortetracilcina, principalmente: Cerdos: micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por M. hyopneumoniae, enteropatía proliferativa porcina (EPP), ileitis porcina causada por Lawsonia intracellularis, Disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae, colitis causada por B. pilosicoli, rinitis atrófica, neumonías, pleuroneumonía porcina, enfermedad de Glässer, sinovitis infecciosa, enteritis necrótica e infecciosa de diversas patologías (salmonelosis, colibacilosis), Linfadenitis estreptocócica (abscesos cervicales) y abscesos de las articulaciones (Staphylococcus spp., Corynebacterium spp, Streptococcus spp.). Infecciones bacterianas secundarias a virus o micoplasmosis. En periodos de estrés para mantener la ganancia de peso corporal. Pollos y pavos: enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Mycoplasma meleagridis (pavos). Enteritis necrótica asociada a Clostridium perfringens, enteritis bacterianas. ORT (Ornithobacterium rhinotracheale). Colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, neumonías, onfalitis, sinovitis infecciosa. Infecciones bacterianas secundarias a virus, coccidias (Eimeria spp.). Infecciones secundarias por E. coli asociadas a rinotraqueitis en pavos. Estrés o mortandad temprana por causas inespecíficas. En periodos de estrés para mantener la ganancia de peso corporal.

Dosis y Administración

Aves (pollos, pavos y pollas de reemplazo): · Preventivo: 1kg/TM de alimento por 7 - 14 días. · Terapéutico: 2.5 kg/TM de alimento por 7 – 10 días. Cerdos: · Preventivo: 1 – 2.5 kg/TM de alimento por 21 días. · Terapéutico: 2.5 – 4 kg/TM de alimento por 7 a 14 días. Mezclar la dosis total con 5% del alimento a ofrecer y luego incorporar al resto.

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.