



TYLVAX® WS

Polvo Soluble

Antibiótico Macrólido de Última Generación.



Formulación

Tilvalosina (como tartrato) 25 g, Excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina, principalmente:

- Pollos, gallos y pavos: enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma cynoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas, ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).
- Cerdos: micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M. hyopneumoniae*, enteropatía proliferativa porcina (EPP), ileitis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina, causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, Colitis porcina causada por *B. pilosicoli*.

Dosis y Administración

Aves (pollos, pavos y pollas de reemplazo):

- Preventivo: 80-100 g/200L de agua los primeros 3 días de vida y 40 – 60g/200L agua 3 – 4 días más o en situaciones de estrés posteriores.
- Terapéutico: 80 – 100g/200L de agua por 3 días.

Cerdos:

- Preventivo: 200 g / 1000 L de agua por 3 – 4 días.
- Terapéutico: 200g / 1000 L de agua por 5 días.

Presentación Comercial

Bolsa x 10g, Bolsa x 50g, Bolsa x 100g, Bolsa x 10 kg, Bolsa x 20 kg, Bolsa x 25 kg, Balde x 1 kg, Balde x 5 kg,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.70.N.1664



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.