TYLVAX® WS

Polvo Soluble

Antibiótico Macrólido de Última Generación.



Formulación

Tilvalosina (como tartrato) 25 g, Excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina, principalmente: · Pollos, gallos y pavos: enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Mycoplasma meleagridis (pavos). Enteritis necrótica asociada a Clostridium perfringens, enteritis bacterianas, ORT (Ornithobacterium rhinotracheale). · Cerdos: micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por M.hyopneumoniae, enteropatía proliferativa porcina (EPP), ileitis porcina causada por Lawsonia intracellularis, Disentería porcina, causada por Brachyspira hyodysenteriae, Colitis porcina causada por B. pilosicoli.

Dosis y Administración

Aves (pollos, pavos y pollas de reemplazo): · Preventivo: 80-100 g/200L de agua los primeros 3 días de vida y 40 – 60g/200L agua 3 – 4 días más o en situaciones de estrés posteriores. · Terapéutico: 80 – 100g/200L de agua por 3 días. Cerdos: · Preventivo: 200 g / 1000 L de agua por 3 – 4 días. · Terapéutico: 200g / 1000 L de agua por 5 días.

Presentación Comercial

Bolsa x 10g, Bolsa x 50g, Bolsa x 100g, Bolsa x 10 kg, Bolsa x 20 kg, Bolsa x 25 kg, Balde x 1 kg, Balde x 5 kg,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.70.N.1664

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.