VETAMYCON 6X

Gel Topical

Asociación polivalente antibiótica, antiinflamatoria, antimicótica y antiprurítica



Formulación

Beclometasona dipropionato 0.025%, Gentamicina 0.3%, Clotrimazole1%, Lignocaína 2%.

Indicaciones

Para el tratamiento de afecciones e infecciones bacterianas y fúngicas de la piel y oídos. Indicado en caso de otitis externa, agudas o crónicas. Onicomicosis y afecciones dérmicas de etiología micótica. Afecciones dérmicas de etiología bacteriana, dermatitis exudativas, eczematosas, seborreica o de contacto, intertrigo u otras piodermas. Tratamiento coadyuvante en casos de dermatitis alérgicas por pulgas, dermatosis y alopecia. En laceraciones, abrasiones o heridas. Infecciones de la glándula paranal en caninos.

Dosis y Administración

Vía Tópica. En afecciones moderadas: De 1 a 7 veces por semana. En condiciones severas, puede ser aplicado 2 - 3 veces diarias (cada 8 - 12 horas). La duración mínima del tratamiento debe ser de acuerdo a la etiología y a la respuesta del curso de la enfermedad, puede variar entre 2 a 6 semanas. La frecuencia de administración depende de la severidad de la lesión y del criterio del Médico Veterinario.

Presentación Comercial

Tubo x 15g, Tubo x 30g, Tubo x 80g,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.F9.39.I.0005

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.

Copyright © 2026 Agrovet Market S.A.