

ZEMETHIS 15 | 30 | 60 | 120 MG

Tabletas Blandas Palatables

Antiemético Antagonista del Receptor
Neurocinina-1 (NK-1)



Formulación

Cada tableta contiene: Zemethis® 15 mg: Maropitant (como maropitant citrato) 15 mg. Zemethis® 30 mg: Maropitant (como maropitant citrato) 30 mg. Zemethis® 60 mg: Maropitant (como maropitant citrato) 60 mg. Zemethis® 120 mg: Maropitant (como maropitant citrato) 120 mg.

Indicaciones

Prevención y tratamiento del vómito agudo. Prevención de los vómitos, incluidos los inducidos por la cinetosis (mareo en el viaje). Prevención y tratamiento de los vómitos y náuseas en perros sometidos a quimioterapia multiagente. Maropitant comprimidos está indicado para la prevención de los vómitos agudos en perros a partir de 2 meses y de los vómitos debidos al mareo en perros a partir de 4 meses.

Dosis y Administración

Vía oral. Prevención de mareos por viajes: 8 mg/kg (la tableta puede partirse para lograr mayor exactitud en la dosis). Zemethis® 15 mg: Vómitos por quimioterapia y otros vómitos: Dosis mínima de 2 mg/kg (1 tableta para perros de 3.75 - 7.5 kg). Zemethis® 30 mg: Vómitos por quimioterapia y otros vómitos: Dosis mínima de 2 mg/kg (1 tableta para perros de 7.5 - 15 kg). Zemethis® 60 mg: Vómitos por quimioterapia y otros vómitos: Dosis mínima de 2 mg/kg (1 tableta para perros de 15-30 kg). Zemethis® 120 mg: Vómitos por quimioterapia y otros vómitos: Dosis mínima de 2 mg/kg (1 tableta para perros de 30 - 60kg).

Presentación Comercial

Caja x 1 ó 4 tabletas blandas masticables en blíster aluminizado sellado x 1 g., Caja x 1 ó 4 tabletas blandas masticables en blíster aluminizado sellado x 2 g.,

Registro Senasa

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.—
F.043.031.N.00026.